











	HORAS	8 	Desayuno 	11-12 	Comida	17 	Merienda	20 	Cena	23 	Al acostarse
ABACAIVIR 600mg + LAMIVUDINA 300mg 											
Tomar con o sin alimento. Pueden aparecer molestias gastrointestinales, cefalea, malestar general. Si apareciera cualquier signo de reacción de hipersensibilidad informar inmediatamente al médico y no volver a tomar el fármaco.											
REZOLSTA (DARUNAVIR 800mg + COBICICISTAT 150mg) 											
Tome el comprimido con alimentos. Puede provocar dolor de cabeza, cansancio, trastornos gastrointestinales o enrojecimiento de la piel. En algunos pacientes le puede subir la glucosa en sangre.											

La combinación abacavir/lamivudina no debe ser administrada junto con análogos de citidina debido a su similitud, como emtricitabina. Si se encuentra en tratamiento con cotrimoxazol, el paciente debe ser vigilado clínicamente. Se desaconseja el uso concomitante de lamivudina junto con cladribina.

Rezolsta tiene interacciones con medicamentos como haloperidol, ondansetron, salmeterol, algunos medicamentos para el colesterol, ciertos opiáceos, algunos antidepresivos, ciertos antibióticos, nuevos anticoagulantes, determinados antihipertensivos, corticoides inhalados, testosterona u hormona del crecimiento; graves con sildenafil y vardenafilo (moderada con tadalafilo), con drogas como heroína, cocaína, LSD, GHB (éxtasis líquido, grave), fenilciclidina (polvo de ángel), ketamina (special k), derivados anfetamínicos (speed, cristal, éxtasis,...) o mefedrona (miau miau); o plantas como uña de gato, levadura roja de arroz o hierba de san Juan. Consulta también las posibles interacciones con anticonceptivos orales.

Estos son sólo algunos ejemplos; si comienzas a tomar cualquier fármaco, complejo vitamínico, productos de herboristería, drogas recreativas, etcétera, **por favor consúltanos**. Independientemente de su beneficio o no beneficio hay algunas que no afectan a su tratamiento, otras que sí y otras que pueden ver alterado su efecto a causa del tratamiento antirretroviral.

LEE ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS

- **SI SE TE OLVIDA ALGUNA TOMA....**
..... y no han pasado 12 horas, tómatela.

.....y hace más de 12 horas que te la tenías que haber tomado, sigue con tu horario normal pasando a la siguiente toma.
- **ii NUNCA TE TOMES EL DOBLE EN LA SIGUIENTE!!**
- Para que tu tratamiento funcione debes tomarte **O TODAS O NINGUNA** de tus medicinas. No deben abandonarse los tratamientos pero, si por algún motivo se te olvida una de ellas o decides no tomar alguna porque piensas que te está sentando mal, debes dejarlas **todas**.
- **SI VOMITAS LAS PASTILLAS** intenta tomarlas de nuevo. Si ya ha pasado más de 30-40 minutos no lo haga, porque ya se habrá absorbido una cantidad significativa del fármaco.
Si ves que no puedes y te sucede con frecuencia explícaselo a tu médico o farmacéutico: existen formas de reducir los vómitos.
- Es muy importante incluir la toma de medicamentos en tu rutina de vida y hacerlo siempre a la **MISMA HORA**.