

SABÍA QUE...

Bedaquilina es un antibiótico que inhibe una ATP sintetasa de las micobacterias con efecto bactericida sobre los bacilos. Se utiliza en regímenes junto a otros fármacos para tratar tuberculosis pulmonares multirresistentes. Ocasionalmente puede usarse para otras bacterias del género Mycobacterium y para otras localizaciones

¿Cómo debo tomarlo ?

Se debe tomar siempre en conjunto con otros medicamentos que hayan demostrado sensibilidad frente a ese germen. Se administra por vía oral y siempre con alimentos, ya que con el estómago vacío sólo se absorbería **la mitad de la dosis** necesaria.

Generalmente son tratamientos de 24 semanas repartidos de la siguiente manera:

- Semanas primera y segunda: 400 mg (4 comprimidos) diarios, siempre a la misma hora del día
- A partir de la tercera semana y hasta la semana 24: 200 mg (2 comprimidos) tres veces en semana, con la menos 48 horas entre tomas

En cualquier caso atégase siempre a las indicaciones de su médico y recuerde que es muy importante acabar el tratamiento completo

Aunque su tratamiento con bedaquilina haya terminado deberá seguir con los otros fármacos todo el tiempo que le indiquen.

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

- ✓ Si está en las primeras dos semanas y ya han pasado más de tres horas **NO TOME** la medicación y espere al día siguiente. Pero es muy importante en este período que no se olvide ninguna. **NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido**
- ✓ Si está en el siguiente período tómela lo antes posible y continúe luego con el régimen de tres veces en semana. No tome nunca dos dosis con menos de 24 horas de diferencia

No tome bedaquilina si:

Es alérgico a la sustancia o a alguno de sus excipientes

Precaución si padece

En embarazo o lactancia consulte a su médico

Si tiene problemas de arritmias cardiacas

En insuficiencia hepática

Este medicamento contiene lactosa

Su médico le realizará controles periódicos para evitar efectos adversos

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Dolor de cabeza y mareos
- Dolores de hueso o musculares
- Molestias gastrointestinales: diarrea, náuseas

Póngase en contacto con su médico si nota:

- Latidos cardiacos más rápidos o más lentos o falta de aire al respirar
 - Tos o vómitos con sangre
 - Dolor en el pecho
 - Pérdida de apetito continuada, cansancio excesivo, orina de color oscura o coloración amarilla en piel u ojos
- Ante cualquier otro síntoma grave

Interacciones

BEDAQUILINA tiene muchas interacciones, a modo de ejemplo:

- Algunos antiepilépticos
- Ciertos antifúngicos (medicamentos contra hongos) o antibióticos
- Algunos fármacos contra el cáncer
- No hay experiencia con fármacos para VIH. Consultar siempre
- **Otros fármacos que puedan alterar el ritmo cardíaco o prolongar el intervalo QT del electrocardiograma**

No olvide nunca consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo