

## SABÍA QUE...

**Kyntheum® (Brodalumab)** es un fármaco inhibidor de la IL-17RA, que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades como psoriasis en placas. El objetivo del tratamiento es, además de aliviar la inflamación y el dolor, detener el curso de la enfermedad, por lo que es importante que no olvide ninguna toma

### Presentaciones y posología

Se presenta en jeringas precargadas de 210 mg y la dosis recomendada es de una jeringa (210 mg) de administración subcutánea en las semanas 0, 1 y 2 al principio. A partir de ahí la dosis de mantenimiento es de 210 mg cada 2 semanas. Se evaluarán los resultados a las 12-16 semanas.

### No usar en caso de:

- Alergia a brodalumab o alguno de sus componentes
- Si padece una infección activa (gripe, infección urinaria, infección de piel,...)
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias, ya que si fuese así correría riesgo de infección grave
- Embarazo o lactancia
- Precaución en pacientes con trastornos psiquiátricos graves

### Consejos:

- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna vacuna o si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental.
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique.
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento.
- Es importante también que siga hábitos saludables y realice ejercicio físico moderado con frecuencia tal como le hayan dicho.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una inyección, póngase la siguiente tan pronto como lo recuerde. Si se ha retrasado menos de 3 días puede administrarse la dosis olvidada y mantener el calendario habitual. Si han pasado más de 3 días, póngase la dosis olvidada y establezca un nuevo calendario a partir de la nueva fecha. Nunca se administre una dosis doble (dos dosis el mismo día) para compensar olvidos.

### Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Riesgo aumentado de infecciones leves. En caso de infecciones graves se debe interrumpir el tratamiento y reanudarlos una vez resuelta
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor)
- Dolor abdominal, diarrea, náuseas
- Cefalea (dolor de cabeza)

Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, cansancio generalizado, heridas que no cicatrizan o problemas dentales



- La vía de administración de Kyntheum es **subcutánea**
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos, como por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas. Alterne el punto de inyección y anótelos
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- No utilice zonas de la piel con hematomas, infectadas, con heridas o afectadas por la psoriasis

Recuerde que es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Antes de la administración debe dejar la jeringa a temperatura ambiente 20-30 minutos. NO USE fuentes de calor para ello



**Jeringas:** Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

### Conservación

Conservar en nevera (2°C-8°C) y protegido de la luz. No congelar. Es estable a una temperatura de 25°C máxima durante 14 días. No utilizar después de la fecha escrita en el envase

### Interacciones

En teoría brodalumab puede afectar al mecanismo de eliminación de otros fármacos aumentando el tiempo de eliminación. Hasta el momento no se ha detectado repercusión clínica, no obstante comente si le prescriben algún medicamento nuevo por si contiene algún fármaco de estrecho margen terapéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al menos 12 semanas después del tratamiento.