

SABÍA QUE...

Ceftazidima es un antibiótico betalactámico con acción bactericida. Actúa sobre bacterias Gram - fundamentalmente, incluida *Pseudomonas aeruginosa*. Se emplea para tratar localmente infecciones oftálmicas: queratitis y endoftalmitis bacterianas, provocadas o que se sospecha que puedan deberse a bacterias sensibles a este antibiótico.


Posología

La dosis puede variar en función del tipo de infección y el momento de su tratamiento. Generalmente se empieza con pautas cada hora o cada 2 horas y después se van espaciando. En cualquier caso atégase a lo que le prescriba el médico y NUNCA abandone el tratamiento aunque note mejoría.

Avisa a su médico si no nota mejoría en los 2-3 primeros días

¿Cómo administrarlo?

- Lávese bien las manos y atempere el colirio con las manos. Sin utilizar ninguna fuente externa de calor
- Incline la cabeza hacia atrás y mire arriba.
- Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival **sin tocarlo** para evitar contaminarlo.
- Aplique en el saco la cantidad exacta.
- Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie
- Cierre el ojo durante uno o dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte.



¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Póngasela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. No se administre una dosis doble para compensar las olvidadas.

No usar si:

Si tiene alergias a vancomicina o a alguno de sus excipientes.

Precaución en:

En general se tolera bien, pero puede causar, sobre todo al principio, visión borrosa. Tenga precaución si tiene que conducir o manejar maquinaria peligrosa.

No utilizar **lentes de contacto** durante el tratamiento.

No debe haber problema, pero si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Efectos adversos

En general se tolera bien y son transitorios. Los más frecuentes son los siguientes:

- Irritación ocular
- Visión borrosa
- Lagrimeo
- Sensación de cuerpo extraño en el ojo.

Interacciones

- ❖ Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 5 minutos entre la administración de uno y otro. Esto es especialmente importante si está en tratamiento con una cefalosporina como **vancomicina**, ya que precipitan si se mezclan. En este caso debería espaciarla al menos 15 minutos
- ❖ Si además se pusiera una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Conservar en lugar seco. Una vez abierto tiene una validez de 7 días en nevera
Deseche el frasco si observa un color amarillento o presencia de partículas