

SABÍA QUE...

El **interferón** es una proteína inmunomoduladora utilizada en muchas situaciones clínicas. En este caso para el tratamiento de neoplasias conjuntivales en pacientes en los cuales existe resistencia, intolerancia o contraindicación para el tratamiento con mitomicina C tópica oftálmica

Tiene también otras indicaciones como en el postoperatorio de la cirugía de pterigión cuando recidiva.


¿Cómo administrarlo?

- **Vía oftálmica.**

- La dosis puede variar, aunque generalmente es una gota cada 4- 6 horas respetando el sueño y una duración entre 12-16 semanas. En cualquier caso, atégase a la dosis prescrita por su médico y no abandone precozmente el tratamiento.

¿Cómo debo aplicarlo?

- ✓ Lávese las manos
- ✓ Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- ✓ Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- ✓ Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival **sin tocarlo** para evitar contaminarlo.
- ✓ Aplique en el saco la cantidad exacta.
- ✓ Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie ocular
- ✓ Cierre el ojo durante unos dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte
- ✓ Recuerde espaciar al menos 5-10 minutos la administración de algún otro colirio.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se **olvida una dosis** póngala si no ha pasado mucho tiempo, si no se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. **NO SE PONGA NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar la que olvidó.
No debe instilarse más de una gota en el (los) ojo(s) afectados.

NO utilice interferón colirio si ...

- ES USTED ALÉRGICO AL PRODUCTO O ALGUNO DE SUS EXCIPIENTES.

Precauciones:

- 1) Evite el uso de **lentes de contacto** durante el tratamiento
- 2) Puede tener **visión borrosa** recién puesto. Hasta que recupere la agudeza visual no debe conducir ni manejar maquinaria peligrosa.
- 3) Consulte si está **embarazada** o en **período de lactancia**

Interacciones de la ciclosporina con otros medicamentos:

Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 10 minutos entre la administración de uno y otro. Si además se pone una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Reacciones adversas:

En general se tolera bastante bien, aunque en algunos pacientes puede aparecer:

- Picor
- Enrojecimiento
- Lagrimeo
- Sensación de cuerpo extraño en el ojo

Informe a su médico ante cualquier otro síntoma que aparezca cuando inicie el tratamiento

En caso de **derrame** lavar muy bien la superficie con agua y jabón.

Recuerde conservarlo en el frigorífico y una vez abierto desechar a los 7 días

Se deben devolver los retos y/o envases no usados al servicio de Farmacia

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente. NO debe ser utilizado por otras personas, aunque presente sus mismos síntomas, podría perjudicarlo.