

SABÍA  
QUE...

**Vancomicina** es un antibiótico con acción bactericida que pertenece al grupo de los glucopéptidos. Actúa sobre bacterias Gram + fundamentalmente, tanto aerobias como anaerobias. Se emplea para tratar localmente infecciones oftálmicas: queratitis y endoftalmitis bacterianas, provocadas o que se sospecha que puedan deberse a bacterias sensibles a este antibiótico.


### Posología

La dosis puede variar en función del tipo de infección y el momento de su tratamiento. Generalmente se empieza con pautas cada hora o cada 2 horas y después se van espaciando. En cualquier caso atégase a lo que le prescriba el médico y NUNCA abandone el tratamiento aunque note mejoría.

Avisa a su médico si no nota mejoría en los 2-3 primeros días

### ¿Cómo administrarlo?

- Lávese bien las manos y atempere el colirio con las manos. Sin utilizar ninguna fuente externa de calor
- Incline la cabeza hacia atrás y mire arriba.
- Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival **sin tocarlo** para evitar contaminarlo.
- Aplique en el saco la cantidad exacta.
- Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie
- Cierre el ojo durante uno o dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte.



### ¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Póngasela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. No se administre una dosis doble para compensar las olvidadas.

### No usar si:

Si tiene alergias a vancomicina o a alguno de sus excipientes.

### Precaución en:

En general se tolera bien, pero puede causar, sobre todo al principio, visión borrosa. Tenga precaución si tiene que conducir o manejar maquinaria peligrosa.

No utilizar **lentes de contacto** durante el tratamiento.

No debe haber problema, pero si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### Efectos adversos

En general se tolera bien y son transitorios. Los más frecuentes son los siguientes:

- escozor o quemazón en el ojo
- Visión borrosa
- Lagrimeo
- Sensación de cuerpo extraño en el ojo.

### Interacciones

- ❖ Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 5 minutos entre la administración de uno y otro. Esto es especialmente importante si está en tratamiento con una cefalosporina como **ceftazidima**, ya que precipitan si se mezclan. En este caso debería espaciarla al menos 15 minutos
- ❖ Si además se pusiera una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Conservar en lugar seco. Una vez abierto tiene una validez de 7 días en nevera  
Deseche el frasco si observa un color amarillento o presencia de partículas

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos