

SABÍA
QUE...

Diazóxido (Proglidem®) en una tiazida (sin efecto diurético) que actúa disminuyendo la liberación de insulina en las células beta del páncreas y por lo tanto aumentando los niveles de glucosa. Tiene un efecto vasodilatador también, pero en este caso, por vía oral, el efecto es mínimo.

Posología y cómo tomarlo

Se administra por vía oral y la dosis depende del objetivo terapéutico. La bajada de la glucemia está estrechamente relacionada con la dosis, con lo cual le determinarán los valores de glucosa con frecuencia, sobre todo al principio del tratamiento. Aténgase siempre a la pauta que le indiquen y no olvide acudir a las revisiones de control.

La pauta diaria total se divide en 2-3 administraciones y es preferible tomarlo después de una comida.

Trague las cápsulas enteras con agua, sin abrirlas ni morderlas.

Qué hacer si ha olvidado una dosis

Tómela tan pronto como sea posible y siga con su pauta normal. NO TOME una dosis DOBLE para compensar las dosis olvidadas.

No utilizar en...

- Si presenta hipersensibilidad a diazóxido, a alguno de los excipientes o a cualquier otro fármaco del grupo de las tiazidas (clortalidona, hidroclorotiazida,...).
- Si está embarazada o plantea quedarse embarazada. Y durante la lactancia. En cualquier caso su médico valorará los riesgos y los beneficios
- En hipoglucemia funcional

Precauciones

- Una vez iniciado el tratamiento es muy importante acudir a los controles para ver los niveles de glucosa, ácido úrico, plaquetas, iones, etcétera
- Ajustar la dosis en insuficiencia renal
- El comprimido de Proglidem® contiene lactosa

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes en adultos son:

- Retención de líquidos
- Aumento de los niveles de ácido úrico
- Molestias intestinales
- Hipotensión
- Puede alterar las cifras de algunos elementos de la sangre
- En algunos pacientes, sobre todo mujeres y niños, puede provocar hirsutismo (crecimiento excesivo del vello)

Hay otros efectos adversos muy raros pero potencialmente graves. Consulte a su médico ante la aparición de cualquier otro efecto adverso

Interacciones con otros fármacos

Hay que tener precaución en tratamiento conjunto con otras tiazidas, otros diuréticos en general o cualquier fármaco que tenga efecto hipotensores. Igualmente hay una interacción lógica con fármacos que afecten a los niveles de glucosa en sangre

También presenta interacciones con otros fármacos como anticoagulantes orales o algunos antiepilépticos

No olvide consultar a su farmacéutico o médico ante otra medicación o planta medicinal que vaya a tomar