

SABÍA
QUE...

Dimetilfumarato es un éster del ácido fumárico con efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores que actúa frenando la inflamación y el daño neuronal en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente.

¿Cómo debo tomarlo?

Siga las indicaciones de su médico, pero lo habitual es comenzar con una pauta ascendente tal como ésta:

- 1ª semana: 1 cápsula de 120 mg en la cena
- 2ª semana: 1 cápsula de 120 mg cada 12 h (D y cena)
- 3ª semana: 1 cápsula de 120 mg en D y 240 mg en cena.
- A partir de la 4ª semana: 1 cápsula de 240 mg cada 12h (desayuno y cena)

Se debe tomar entero, con una comida con suficiente contenido graso. En pacientes que presentan rubor y molestias gastrointestinales la toma con alimentos hace que estos efectos sean menos molestos. Se presenta en cápsulas con cubierta **gastroresistente**, con lo que **NO DEBE ABRIR** la cápsula, ni romperla ni masticarla.

¿Qué hacer si olvido una dosis?

Si aun **NO han pasado 4 horas**: tomé la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual.

Si han pasado **más de 4 horas** desde el olvido: No tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma.

NUNCA tome una dosis **doble** para compensar un olvido.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

No use dimetilfumarato si:

Es alérgico al principio activo o alguno de los excipientes.
Si está embarazada o en periodo de lactancia.

Precaución en:

Insuficiencia hepática o renal grave.
Enfermedad gastrointestinal activa grave.

Efectos adversos:

- Rubefacción (calor, enrojecimiento y ardor).
 - Molestias gastrointestinales (náuseas, diarrea y dolor abdominal), sobre todo al principio. Su médico le puede prescribir antieméticos (para las náuseas) o protectores de estómago para intentar minimizar estos efectos. Es importante que se los tome
 - Exantema.
 - Leucopenia (disminución del número linfocitos, leucocitos,...)
- Su médico le pedirá análisis de sangre para ver como van sus defensas y su función hepática. Es raro, pero si el rubor que habitualmente padece fuese especialmente intenso póngase en contacto también con él.

Interacciones:

Durante el tratamiento con dimetilfumarato se debe evitar el uso de otros derivados del ácido fumárico (tópicos y sistémicos).
Si tiene que ponerse alguna vacuna pregunte a su médico. Hay algunas vacunas con las que hay que tener precaución y otras con las que hay que buscar una alternativa.
Precaución si tiene que seguir alguna otra terapia con fármacos inmunosupresores. Esto no afecta a los ciclos de corticoides.
Precaución también con algunos antibióticos, diuréticos y antiinflamatorios.

Consulte a su farmacéutico o médico si va a tomar alguna medicación o preparado nuevo