

# Invanz: Ficha Técnica de Elaboración

## Datos de la fórmula magistral

Dp./ (copia receta facultativo)	Cantidad	Unidad
Invanz (ertapenem) 1g	1	g
Lidocaína 2%	1.6	ml
Agua para inyectable	1.6	ml

Material de acondicionamiento: Jeringas y agujas

## Modus Operandi

**Primer paso:** Con una jeringa, se toman 1.6 ml de agua para inyectables, y posteriormente se toman 1.6 ml de lidocaína al 2% (sin vasoconstrictor), obteniendo 3.2 ml de **lidocaína al 1%**.

**Segundo paso:** Reconstituir el vial de **Invanz 1 g** con los 3.2 ml de lidocaína al 1% previamente preparados.

**Ante cualquier duda, póngase en contacto con el Servicio de Farmacia Hospitalaria del HU Virgen Macarena.**

### Algunas consideraciones:

Informe a su médico si está en tratamiento con ácido valproico (Depakine) para la epilepsia. Se han notificado casos de mareos y somnolencia, con lo cual precaución si tuviese que conducir.

Deben **inspeccionarse visualmente** la solución reconstituida para que no hubiese partículas o decoloración. Las soluciones de Invanz varían desde incoloras hasta amarillo pálido. Una variación de color dentro de este rango no afecta a la eficacia.



Horario de atención de 8.30 a 15.00



**MAÑANA**  
DE LUNES A VIERNES  
8.30 – 14.00

**TARDE**  
LUNES a JUEVES  
16.00 – 19.30