

SABÍA QUE...

A usted le han prescrito **fenoxibenzamina** para el tratamiento de la presión arterial alta causada por un tumor de las glándulas suprarrenales. Se utiliza cuando otra medicación alternativa no es apropiada. Se puede usar también para otras indicaciones como ciertos tipos de incontinencia.

Posología y forma de administración

Se administra por vía oral y tanto la dosis como la duración del tratamiento depende mucho de la indicación y la gravedad del cuadro. Aténgase siempre a lo que le diga su médico. En caso de dosis altas debe repartirlo en 2-3 tomas al día.

Trague las cápsulas enteras con agua, sin abrirlas ni morderlas. Y debe estar con el **tronco erguido**, con abundante líquido y preferiblemente después de una comida.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Tome la dosis tan pronto como lo recuerde, pero si ya está más cerca de la próxima toma no lo haga, espere a la siguiente toma y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar olvidos

No usar en caso de...

- Presentar hipersensibilidad a fenoxibenzamina o a alguno de los excipientes
- Haber sufrido alguna vez un derrame cerebral
- Haber tenido un ataque al corazón (trombosis coronaria) en el último mes
- Durante la lactancia.
- En caso de insuficiencia renal grave

Embarazo

La decisión sobre el uso de fenoxibenzamina en el embarazo debe tomarse solo tras una evaluación estricta de beneficio/riesgo. En el caso del uso de fenoxibenzamina en el embarazo, será necesario una monitorización neonatal intensiva de la hipotonía y problemas respiratorios en los primeros días de vida

Precauciones

Si su presión arterial es anormalmente baja por alguna causa

Si tiene angina de pecho

Si padece alguna enfermedad cardíaca o fallo cardíaco (por ejemplo: hinchazón de los tobillos)

Si tiene vasodilatación de las arterias, incluida las cerebrales.

Esta medicación puede provocar sueño. Evite conducir y otras actividades de riesgo hasta ver cómo le afecta a usted.

Las comidas copiosas, el esfuerzo físico, el alcohol y otros medicamentos pueden aumentar el efecto hipotensor de fenoxibenzamina.

Efectos adversos:

Se tolera bien en general, pero los efectos adversos más frecuentes descritos son:

- Mareos o sueño
- Congestión nasal
- Dolor estomacal, náuseas o diarrea
- Miosis (contracción de las pupilas)
- Hipotensión ortostática y taquicardia refleja. Debe tener precaución al levantarse rápidamente de un asiento, sobre todo al principio.

Si experimentase algún efecto adverso grave de cualquier tipo póngase en contacto con su médico

Interacciones:

Debe tener cuidado con cualquier medicamento que pueda provocar bajada de la presión arterial. No sólo antihipertensivos sino cualquier otro fármaco que pueda potenciar ese efecto como:

Tizanidina

Algunos depresores del SNC

Cualquier medicamento para la hipertensión arterial como sildenafil, etcétera

No se olvide informar a su farmacéutico o médico sobre cualquier medicación o preparado medicinal que tome, incluidas plantas medicinales.