

SABÍA QUE...

El acetato de glatiramero es un fármaco que modula el funcionamiento del sistema inmunitario, reduciendo los daños en el sistema nervioso central asociados a la esclerosis múltiple (disminuyendo el número de brotes y su gravedad).

Posología

→ Siga las indicaciones de su médico.

La dosis habitual es de 40 mg administrados tres veces por semana. La pauta y dosis podrá ser modificada por su médico.

Qué hacer si ha olvidado una dosis

-Si aun NO han pasado 24 horas póngase la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual.

-Si han pasado más de 4 horas desde el olvido espere a la próxima toma o bien modifique los días de horario.

NUNCA se ponga una dosis doble para compensar un olvido

No utilizar en...

Es alérgico al acetato de glatiramero o a cualquiera de los demás componentes de Copaxone®.

Está embarazada o cree que pudiera estarlo.

Precauciones

- Tiene problemas renales.
- Padece alguna enfermedad cardíaca.
- Se encuentra en periodo de lactancia
- Nota cualquiera de los siguientes síntomas: sarpullido, inflamación (párpados, cara, labios), dificultad para respirar, convulsiones.

Efectos adversos

- Reacción en el punto de inyección
- Vasodilatación ocasional (rubor), dificultad para respirar, palpitaciones o sensación de opresión en el pecho a los pocos minutos de la inyección. Estos síntomas son de corta duración y normalmente no suponen ningún problema.
- Reacción alérgica (poco frecuente).
- Alteraciones digestivas (nauseas, vómitos).

- La vía de administración de Copaxone es **subcutánea**.
- Antes de la administración, deje la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.



Recuerde que es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora.

Este díptico NO contiene toda la información de este fármaco, sólo pretende ser un resumen de ayuda al paciente con su tratamiento.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.