

SABÍA QUE...

Se ha demostrado que un mensajero químico llamado CGRP interviene en la aparición de la migraña. El principio activo de Ajovy®, **fremanezumab**, es un anticuerpo monoclonal (un tipo de proteína) diseñado para unirse al CGRP bloqueando la unión de éste a su receptor y previniendo así que se provoque la migraña.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

La migraña es una cefalea caracterizada por episodios recurrentes de dolor, de 4 a 72 horas de duración, que se acompaña de síntomas intestinales y sensitivos. El dolor suele ser de intensidad moderada a grave, unilateral y con punzadas, empeorando con la actividad física; y suele acompañarse de náuseas, fonofobia y fotofobia. Puede cursar con o sin aura.

Este tratamiento NO cura la enfermedad. El objetivo es preventivo: reducir la frecuencia, intensidad y duración de las crisis, mejorando así la calidad de vida y reduciendo el impacto de la enfermedad en la actividad diaria del paciente

Posología

Las pautas habituales son 225 mg (1 jeringa) al mes o 675 mg (3 jeringas) cada 3 meses. No obstante siga siempre las instrucciones de su médico

Qué hacer si ha olvidado una dosis

- Administre la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde y continúe con su pauta habitual a partir de esta última dosis administrada

NUNCA se ponga una dosis doble para compensar un olvido

Precauciones

- Pacientes con ciertas enfermedades cardiovasculares graves
- No olvide seguir las medidas higiénico-dietéticas del sueño, ejercicio regular y manejo de desencadenantes, que deben seguir siendo la base de la prevención.
- Si está embarazada o cree que puede estarlo no se lo ponga sin consultar a su médico.

No utilizar en caso de...

- De alergia a fremanezumab o cualquiera del resto de componentes de Ajovy®
- En periodo de lactancia

Efectos adversos: En general se tolera bien, pero puede presentarse:

- Reacciones en la zona de inyección o picor

Si notase cualquiera de los siguientes síntomas: espasmos musculares muy frecuentes, sarpullido, inflamación (párpados, cara, labios), dificultad para respirar o convulsiones, **avise a su médico**



- La vía de administración de fremanezumab es **subcutánea**.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas .
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.

Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor **de media hora**

Interacciones

No se esperan interacciones con otros medicamentos, no obstante comuníquenos cualquier tratamiento nuevo con fármacos o plantas medicinales ya que, por ejemplo, tomados de forma crónica podrían favorecer a la aparición de estreñimiento o interferir con otra medicación preventiva que tenga.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos