

## SABÍA QUE...

**Lebrikizumab** es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la interleukina 13 (IL-13) y que se utiliza para el tratamiento de adultos con dermatitis atópica (eccema atópico) de moderada a grave que no responden a otros tratamientos o que otros tratamientos estén contraindicados.

El **objetivo** del tratamiento es conseguir mejorar sensiblemente tanto el picor como el enrojecimiento y la sequedad de piel y alcanzar períodos de remisión.

### Presentaciones y posología

**Ebglyss®** se presenta en jeringas precargadas o plumas de 250 mg en 2 ml.

La pauta recomendada es una dosis inicial de 500 mg (dos jeringas) las dos primeras veces: al principio y dos semanas después.

A partir de ese momento son 250 mg cada 14 días hasta la semana 16 (si acaso 24).

En ese momento su médico valorará la respuesta y debe retirarlo si no ha habido respuesta o prescribirle la dosis de mantenimiento: una jeringa de 250 mg cada 4 semanas.

No está contraindicado el uso de corticoides tópicos cuando sea necesario y podrían proporcionar un efecto adicional. Pueden utilizarse también inhibidores tópicos de la calcineurina (tacrolimus y pimecrolimus), pero deben reservarse para zonas problemáticas únicamente, como el rostro, el cuello, las zonas intertriginosas y la zona genital.

### Contraindicaciones y precauciones:

- Alergia a lebrikizumab o alguno de sus componentes.
- Si padece una infección activa. Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias para verificarlo
- Pacientes con infecciones por helmintos (hidatidosis, esquistosomiasis, ascariasis,) deben ser tratados previamente al inicio del tratamiento y suspender dupilumab si no está respondiendo al tratamiento antihelmíntico.
- Embarazo o lactancia: no hay datos en animales que indiquen efectos dañinos sobre el feto. En caso de embarazo su médico evaluará el riesgo/beneficio

### Consejos:

- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna vacuna o si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental.
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a las revisiones con la frecuencia que su médico le indique.
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento.
- Es importante también que siga hábitos saludables y realice ejercicio físico moderado con frecuencia tal como le hayan dicho.

### ¿Cómo se administra?



La vía de administración de lebrikizumab es **subcutánea**.

- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalga.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.

Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. NO utilice ninguna FUENTE DE CALOR para ello.

**¡Deseche la jeringa si la solución está turbia, decolorada o contiene partículas visibles !!**



**Jeringa:** Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

**Pluma:** Siga las instrucciones del prospecto. Tras la inyección, presionar con un algodón el sitio de inyección durante unos segundos y no frotar.

**Si olvida una inyección**, póngase la siguiente tan pronto como lo recuerde. Si se ha retrasado menos de 3 días debe administrarse la dosis olvidada y mantener el calendario habitual. Si ha pasado más de 3 días, póngase la dosis olvidada y establezca un nuevo calendario a partir de la nueva fecha. Nunca se administre una dosis doble (dos dosis el mismo día) para compensar dosis olvidadas.

### Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Riesgo aumentado de infecciones, sobre todo infecciones oculares y con menos frecuencia herpes labiales. En caso de infecciones graves debe interrumpir el tratamiento y reanudarlo una vez resuelta. En cualquier caso consulte a su médico al respecto.
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor y enrojecimiento)
- A veces inflamación y picazón en ojos y párpados
- Aumento del número de eosinófilos, generalmente leve y transitorio

Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, cansancio generalizado, heridas que no cicatrizan, o problemas dentales.

### Interacciones

No hay descritas interacciones de lebrikizumab con otros fármacos salvo el caso de vacunas con gérmenes vivos. No obstante consulte ante cualquier medicamento que vaya a tomar, sobre todo aquellos que afecten al sistema inmunológico

Conservar en nevera (2°C-8°C) y protegido de la luz. No congelar.  
Es estable a una temperatura de 25°C máxima durante 7 días.