

SABÍA
QUE...

Linezolid es un antibiótico bacteriostático, con actividad frente a gérmenes Gram +, que también es eficaz frente a bacterias del género Mycobacterium. Si no hay contraindicaciones se debe usar en el tratamiento de formas multirresistentes de tuberculosis

¿Cómo debo tomarlo ?

Se administra por vía oral con o sin alimentos y habitualmente es de 600 mg cada 12 h. No obstante en el tratamiento de la tuberculosis la dosis habitual es de 600 mg pero **una sola vez al día**. Incluso le podrían indicar 300 mg una vez al día. Atégase siempre a lo que le indique su médico.

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar ni chupar en la boca ni disolverlos

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Si aún **NO han pasado 6 horas**, tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual. Si han pasado **más de 6 horas** no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma

NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido

No tome linezolid si:

Es alérgico a LINEZOLID o a alguno de sus excipientes
Está embarazada o en periodo de lactancia

Precaución si padece

Hipertensión arterial (no controlada) o feocromocitoma
Síndrome carcinoide
Tirotoxicosis
Historial de convulsiones
Insuficiencia renal o hepática grave
La forma oral líquida puede contener fenilalanina. Hable con su médico antes de usarla si usted padece fenilcetonuria

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Dolor de cabeza, insomnio
- Gusto metálico
- Molestias gastrointestinales: diarrea, náuseas

Póngase en contacto con su médico si nota:

- Problemas de visión: en la agudeza visual, cambio en los colores
- Hormigueo o dolor de extremidades
- Piel pálida con sensación de desmayo y dificultad respiratoria
- Sangrado frecuente, hematomas o manchas en la piel rojas o moradas
- **Acidosis metabólica**: vómitos y diarrea frecuente, dolor abdominal o respiración acelerada
- **Síndrome serotoninérgico**: confusión, fiebre muy alta, sudoración, rigidez muscular, agitación, alucinaciones

Interacciones

LINEZOLID tiene bastantes interacciones, como por ejemplo:

- Antimigrañosos: ergotamínicos (muy frecuente), triptanos (menos frecuente)
- Antidepresivos: IMAO, tricíclicos, ISRS
- Simpaticomiméticos: broncodilatadores adrenérgicos, pseudoefedrina, fenilpropanolamina (ojo a los antigripales)
- Algunos opiáceos: petidina, fentanilo, dextrometorfano, tramadol
- Medicamentos contra los vómitos: metoclopramida, ondansetron, granisetron
- Algunas plantas medicinales: ginseng, hipérico
- Alimentos ricos en tiramina: carnes secas, ahumadas o encurtidas, quesos curados, chocolate, bebidas alcohólicas no destiladas, salsa de soja
- Suplementos como el triptófano

No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo