

SABÍA
QUE...

Natamicina (Natacin®) o pimaricina es un antibiótico aislado de algunas especies de *Streptomyces* usado como fungicida en el tratamiento de la blefaritis, conjuntivitis y queratitis causadas por hongos susceptibles, incluida la queratitis por *Fusarium solan*. Es frecuente también que forme parte de un tratamiento combinado con más de un fármaco

Posología


La posología dependerá del tipo de infección. A modo de ejemplo en blefaritis o conjuntivitis se suele usar una gota cada 6 horas, mientras que en el caso de queratitis requiere dosis más frecuentes los primeros 4-5 días. En cualquier caso atégase a lo que le diga su médico.

Avise a su médico si no nota nada de mejoría en los 2-3 primeros días

Los tratamientos frente a hongos suelen ser largos. NUNCA lo abandone si no se lo indican así

¿Cómo administrarlo?

- Lávese bien las manos y atempere el colirio con las manos. Sin calentar
- Inclíne la cabeza hacia atrás y mire arriba.
- Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- Aproxíme el cuentagotas al saco conjuntival **sin tocarlo** para evitar contaminarlo.
- Aplique en el saco la cantidad exacta.
- Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie
- Cierre el ojo durante uno o dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte.



¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Póngasela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. No se administre una dosis doble para compensar las olvidadas.

No usar si:

Si tiene alergias al principio activo o a alguno de sus excipientes.

Precaución en:

Durante el **embarazo o lactancia** hable con su médico. Tiene categoría C de la FDA con lo que no debería usarse en embarazo, pero su absorción a la sangre es mínima. Háblelo siempre con su médico para valora el beneficio y el riesgo

Contiene cloruro de benzalconio como conservante

Puede causar, sobre todo al principio, visión borrosa. Tenga precaución si tiene que conducir o manejar maquinaria peligrosa.

Se aconseja un seguimiento cuidadoso de aquellos pacientes que padezcan ojo seco y que utilicen el producto durante periodos prolongados; o en aquellas condiciones en las que la córnea esté comprometida

Evite **lentes de contacto** durante el tratamiento.

Efectos adversos

Los más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Erupción o irritación alrededor de los ojos.
- Visión borrosa

Póngase en contacto con su médico si notase alguna reacción adversa grave o síntomas de alergia al medicamento

Interacciones

Como prácticamente no se absorbe en sangre no se esperan interacciones con otros medicamentos, pero en general

- ❖ Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 5 minutos entre la administración de uno y otro.
- ❖ Si además se pusiera una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Mantenga el envase a temperatura ambiente, protegidos del calor y de la humedad.

Una vez abierto no debe conservarse más de **28 días**