

SABÍA QUE...

Ofatumumab (Kesimpta®), es un anticuerpo monoclonal que se une a una fosfoproteína llamada CD20. Esta unión provoca la ruptura de los linfocitos CD20+ que intervienen en la inflamación, impidiendo así que se provoque más daño en la vaina de mielina de las neuronas. Está indicado en esclerosis múltiple, tanto en formas recurrentes-remitentes como en secundarias progresivas.

Posología

→ Se comienza con una pauta de inicio de la siguiente manera:

Primera inyección, a la semana otra inyección, a la semana una nueva inyección, a la tercera semana nada y a la cuarta una más. A partir de ahí una administración mensual

Semana 0	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8
								

Qué hacer si ha olvidado una dosis

- Si NO han pasado 24 horas, póngase la dosis olvidada y continúe con el calendario habitual
- Si han pasado más de 24 horas desde el olvido, póngasela y continúe con la pauta mensual a partir de esa fecha.
- Si la dosis olvidada es de las tres primeras consulte a su médico
- **Nunca** se ponga dosis dobles para compensar olvidos.

No utilizar en...

- Alérgicos a ofatumumab o cualquiera de los demás componentes de Kesimpta®
- Si tiene el sistema inmunitario en grave compromiso
- Diagnosticado un proceso cancerígeno activo
- En general se debe evitar en caso de embarazo; no obstante valore conjuntamente con su médico los beneficios y los riesgos
- Antes de iniciar debe asegurarse de sufrir un proceso infeccioso activo, incluido hepatitis B o tuberculosis

Interacciones

No se esperan interacciones con otros medicamentos en cuanto a la biodisponibilidad, pero sí debe tenerse mucha precaución cuando se administra conjuntamente con otros fármacos inmunosupresores, incluyendo tratamientos prolongados con corticoides.

¡ Precauciones !

Antes de iniciar tratamiento y periódicamente le harán un análisis para descartar infección por virus JC. Es un virus que podría estar en pequeña cantidad en el organismo sin causar enfermedad, pero que al alterarse el sistema inmunitario podría comenzar a multiplicarse.

Avisé rápidamente a su médico ante la aparición de cualquier síntoma que pudiera estar relacionado: Confusión, debilidad, trastornos en la visión, torpeza, dificultad para hablar, cambio brusco de humor,...

En caso de lactancia no hay evidencia de contraindicación, pero consulte a su médico.

Si tuviese que vacunarse consulte siempre. Existen vacunas que no debe ponerse si está en tratamiento con ofatumumab.

Efectos adversos

Se tolera bastante bien, no obstante puede aparecer

- Más frecuencia de infecciones leves como infecciones urinarias o nasofaringitis, así como herpes en personas susceptibles
- Dolor en el punto de inyección
- Náuseas al principio
- Dolor de cabeza y mareos



- La vía de administración es **subcutánea**
- Antes de la administración, deje la pluma fuera de la nevera alrededor de 20-30 minutos
- Las mejores zonas para la inyección son aquéllas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo o muslo.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- Alterne el punto de inyección y anótelo
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta
- Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto al uso de la pluma.

Es importante que prepare la medicación en un espacio **limpio y despejado**, y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos