

SABÍA  
QUE...

## Sobre su medicación

**Osilodrostat** es un inhibidor de la enzima CYP11B, que interviene en la síntesis de cortisol en la glándula suprarrenal. Está indicado, cuando hayan fracasado otras opciones, en el tratamiento del síndrome de Cushing, provocado precisamente por una excesiva producción de cortisol por parte de las glándulas adrenales

### OBJETIVOS del TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento es disminuir los niveles de cortisol en sangre y mejorar así los síntomas provocados por el exceso: debilidad, aumento de peso inusual, problemas de cicatrización, cambios de humor, piel más fina, etcétera.

No olvide seguir las recomendaciones en cuanto a ejercicio físico y dieta que le indiquen. A pesar de tener controlados los niveles está expuesto a un mayor riesgo cardiovascular: Controle azúcar, tensión arterial, colesterol y peso. Asimismo tenga en cuenta la salud de sus huesos

### ¿Cómo tomarlo?

La dosis de inicio recomendada es de 2 mg de osilodrostat dos veces al día. No obstante su médico le indicará su dosis y pauta exacta.

La dosis **es individual** para cada paciente, y va en función de los niveles de cortisol. Es muy **IMPORTANTE** que acuda a los controles analíticos que le indiquen, que sobre todo al principio serán frecuentes

**Vía oral.** Debe ingerir los comprimidos con un vaso de agua **CON O SIN COMIDA** y siempre a la misma hora más o menos

**-Durante el tratamiento no debe** tomar alcohol.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado su dosis tómela tan pronto como sea posible mientras no hayan pasado más de 6 horas, si así fuera, espere a la siguiente toma y continúe el tratamiento a la hora habitual.

**NO TOME NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar la que olvidó.

### Precauciones:

- Adopte medidas anticonceptivas si puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento.
- Precaución en pacientes con prolongación del intervalo QT o cualquier alteración del ritmo cardiaco.
- Es posible que necesite suplementos de potasio o magnesio. No olvide nunca acudir a los controles analíticos que le indiquen.

### No tome OSILODROSTAT si ...

- ES USTED ALÉRGICO AL PRODUCTO O ALGUNO DE SUS EXCIPIENTES.
- Está embarazada o pudiera estarlo.
- Está en período de lactancia.
- Pacientes con enfermedades hepáticas graves

### Reacciones adversas:

Las reacciones adversas más **frecuentes** que puede causar son hipotensión, mareos, edema (avise si se le hinchan excesivamente las piernas), náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, disminución del apetito, cefalea o exceso de vello.

Puede producir una alteración del ritmo cardiaco, avise si nota algo anómalo

También puede hacer que le bajen los niveles de potasio. Informe igualmente si tuviese calambres, debilidad muscular, mucha sed y muchas ganas de orinar,....

**Informe en general a su médico si tiene algún síntoma a raíz de empezar este tratamiento.**

### Interacciones con otros medicamentos:

OSILODROSTAT tiene interacciones con muchos fármacos, algunas potencialmente peligrosas que pueden afectar a la eficacia de los tratamientos o provocar efectos adversos.

Ese efecto sobre el ritmo cardiaco de prolongar el intervalo QT puede verse agravado si toma conjuntamente otro fármaco que también los produzca

Igualmente interacciona con otros fármacos que se metabolizan por la misma vía.

**Consulte siempre con su farmacéutico o su médico ante cualquier fármaco, producto de herboristería o complejo vitamínico que pueda tomar**

Más información en:

<https://www.orpha.net/pdfs/data/patho/Pub/es/GuiaSindromeCushing.pdf>