

SABÍA
QUE...

El **propiltiouracilo** pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antitiroideos y actúa impidiendo que la glándula tiroidea produzca la hormona tiroidea. Esto hace que se use para tratar el hipertiroidismo. No está comercializado en España, con lo que su uso se restringe a situaciones donde estén contraindicados carbimazol o metimazol: alergia y embarazo.



Cómo debo tomarlo



Tanto la dosis como el número de tomas al día es muy variable según el paciente. Atégase a lo que le haya especificado su médico.

Los comprimidos deben tomarse enteros, sin chuparlos en la boca ni masticarlos ni disolverlos, preferiblemente después de una comida y acompañados de un buen vaso de agua.

Mantenga siempre el mismo horario.

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómesela tan pronto como sea posible, pero si ya han pasado más de la mitad del tiempo entre tomas espere a la siguiente. NUNCA tome una dosis doble para compensar las olvidadas.

Si vomita recién tomado el comprimido vuelva a tomarlo. Si ha pasado ya un tiempo no repita la dosis.

– En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico –

No usar si:

Si tiene alergias al principio activo o a alguno de sus excipientes.

No debe usarlo si padece enfermedad hepática grave o ha sufrido agranulocitosis recientemente.

Precauciones

Antes de empezar el tratamiento su médico le hará un análisis de sangre para ver como tiene las enzimas hepáticas y el recuento de células sanguíneas.

Si al poco tiempo de iniciar el tratamiento nota aparición de fiebre, malestar general e inflamación de la mucosa bucal y garganta acuda pronto a su médico para que le vuelvan a hacer un análisis de sangre

Los comprimidos contiene lactosa

Efectos adversos

En general se tolera bien, aunque podría aparecer:

- Picor en la piel y sarpullido
- Molestias gastrointestinales
- Cierta caída del cabello
- Mareos y dolor en músculos y articulaciones

AVISE RÁPIDAMENTE A SU MÉDICO en caso de notar los síntomas arriba descritos. Son raros, pero en caso de aparecer se debe actuar sin tardanza.

Interacciones con otros fármacos:

El propiltiouracilo tiene interacciones con otros fármacos como:

- Betabloqueantes usados para la hipertensión o el corazón: atenolol, carvedilol,...
- Anticoagulantes orales
- Otros como digoxina, teofilina

En cualquier caso no olvide consultar a su farmacéutico o médico ante cualquier duda o si le recetan algún tratamiento nuevo.

