



		8	Desayuno	11-12	Comida	17	Merienda	20	Cena	23	Al acostarse
	HORAS										
REZOLSTA											
<p>Rezolsta contiene darunavir potenciado con cobicistat. Debe tomar el comprimido con alimentos. Puede provocar dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales, cansancio o enrojecimiento de la piel sobre todo al principio. En algunos pacientes le puede subir la glucosa en sangre.</p>											

Rezolsta tiene interacciones con medicamentos como haloperidol, ondansetron, salmeterol, clopidogrel, algunos medicamentos para el colesterol, ciertos opiáceos, algunos antidepresivos, ciertos antibióticos, nuevos anticoagulantes, determinados antihipertensivos, corticoides inhalados, testosterona u hormona del crecimiento; graves con sildenafil y vardenafilo (moderada con tadalafilo), fármacos para dolores de cabeza como ergotamina o dihidroergotamina, con drogas como heroína, cocaína, LSD, GHB (éxtasis líquido, grave), fenilciclidina (polvo de ángel), ketamina (special k), derivados anfetamínicos (speed, cristal, éxtasis,...) o mefedrona (miau miau); o plantas como uña de gato, levadura roja de arroz o hierba de san Juan. Consulta también las posibles interacciones con anticonceptivos orales.

Estos son sólo algunos ejemplos; si comienzas a tomar cualquier fármaco, complejo vitamínico, productos de herboristería, drogas recreativas, etcétera, **por favor consúltanos**. Independientemente de su beneficio o no beneficio hay algunas que no afectan a su tratamiento, otras que sí y otras que pueden ver alterado su efecto a causa del tratamiento antirretroviral.

LEE ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS

- **SI SE TE OLVIDA ALGUNA TOMA.....**
..... y no han pasado 12 horas, tómatela.

.....y hace más de 12 horas que te la tenías que haber tomado, sigue con tu horario normal pasando a la siguiente toma.

ii NUNCA TE TOMES EL DOBLE EN LA SIGUIENTE PARA COMPENSAR UN OLVIDO!!
- **SI VOMITAS LAS PASTILLAS** intenta tomarlas de nuevo. Si ya ha pasado más de 30-40 minutos no lo haga, porque ya se habrá absorbido una cantidad significativa del fármaco.
Si ves que no puedes y te sucede con frecuencia explícaselo a tu médico o farmacéutico: existen formas de reducir los vómitos.
- Es muy importante incluir la toma de medicamentos en tu rutina de vida y hacerlo siempre a la **MISMA HORA**