

SABÍA QUE...

- **Sativex®** es una solución para pulverización bucal que contiene extractos de cannabis (denominados “cannabinoides”).
- Se utiliza en **esclerosis múltiple (EM)** para mejorar los síntomas relacionados con la rigidez muscular, es decir, más dificultad de lo normal para mover los músculos, también llamado “espasticidad”.

Posología

Cada persona necesita un número diferente de pulverizaciones para obtener el mayor alivio de su rigidez muscular con el menor número de efectos adversos.

La dosis máxima recomendada es de 12 pulverizaciones al día

Al iniciar el tratamiento con Sativex®, deberá seguir los días y las horas indicados en la tabla proporcionada más adelante hasta determinar cuál es el número óptimo de pulverizaciones para usted.

La primera vez que abra un envase pulverizador realice 2 ó 3 pulverizaciones de prueba sobre un pañuelo para preparar el pulverizador y asegurarse de que funciona correctamente.

Úselo con el estómago lleno o vacío pero intente que sea siempre en las mismas condiciones.

Una vez abierto, conservar Sativex en posición vertical a una temperatura inferior a 25 C. **LA VALIDEZ UNA VEZ ABIERTO ES DE 42 DÍAS.**

No utilizar en...

- Si es alérgico a los extractos de cannabis o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si usted o alguien relacionado directamente con usted padece algún tipo de trastorno mental. Esto no incluye la depresión debida a su esclerosis múltiple.
- Si se encuentra en período de lactancia.

Interacciones

Hay fármacos que pueden hacer que aumente el efecto de Sativex® o que disminuya éste. **Consulte siempre** que le prescriban un fármaco o planta medicinal nueva, ya que pueden ser necesarios ajuste de dosis. Especialmente importante en el caso de otros fármacos depresores del sistema nervioso central.

Precauciones

- Si está embarazada o intenta quedarse embarazada.
- Precaución a la hora de manejar maquinaria peligrosa
- Si padece epilepsia o crisis epilépticas frecuentes (convulsiones).
- Si tiene problemas de hígado o de riñón.
- Si padece algún problema cardíaco grave
- Si tiene antecedentes de consumo de drogas o abuso de sustancias.

Efectos adversos

Se dan fundamentalmente en la fase inicial de titulación (primeras dos semanas aproximadamente), aunque algunas veces pueden continuar

- Sensación de mareo o cansancio. Procure levantarse despacio cuando esté sentado.
- Somnolencia o confusión.

Consulte a su médico si notase

- Pérdida de contacto de la realidad.
- Depresión: informe ante cualquier síntoma de depresión.
- Irritabilidad frecuente

¿Cómo se administra?

- Coloque el pulverizador entre los dedos pulgar y corazón, y apoye el dedo índice sobre la boquilla. Agítelo antes de empezar las pulverizaciones.
- Manténgalo en posición vertical y diríjalo hacia la boca. Coloque la boquilla debajo de la lengua o hacia la cara interna de la mejilla. Varíe el lugar de aplicación de las pulverizaciones a fin de evitar la aparición de molestias en una zona.
- Presione firmemente la boquilla. No efectúe más de una pulverización a la vez, incluso si le parece que la cantidad pulverizada es pequeña. (Debe dejar transcurrir 15 minutos entre cada pulverización.)
- Vuelva a colocar el capuchón protector.

En caso de pulverización accidental en los ojos lávelos inmediatamente.
NO INHALE el producto
No lo utilice cerca de llamas vivas o fuente de calor.
Precaución con la toma concomitante de alcohol