

SABÍA
QUE...

[Sobre tolvaptan]

TOLVAPTAN se utiliza para el tratamiento del “síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH)”. Esta enfermedad da lugar a una producción inadecuada de hormona vasopresina, lo que provoca una reducción grave en los niveles de sodio (hiponatremia). Este medicamento antagoniza la acción de la vasopresina y mejora el flujo de agua en orina volviendo los niveles de sodio en sangre a la normalidad de forma progresiva.

Presentación y cómo tomarlo

Generalmente se comienza con dosis bajas y la dosis habitual suele ser de 15mg una vez al día por la mañana, pudiendo aumentarse hasta dosis máximas de 60mg. Su médico le hará controles periódicos para ver como están los niveles de sodio. Aténgase a lo que él le vaya diciendo.

Tómelo sin masticar, en ayunas o bien con una comida ligera. Evite tomarlo con comidas abundantes o pesadas.

Evite también el ZUMO DE POMELO. Puede alterar los niveles del tolvaptan.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, pero si ya han transcurrido más de 12 horas espere a la toma siguiente. NO TOME una dosis DOBLE para compensar dosis olvidadas

Contraindicaciones-. No tome tolvaptan si:

Presenta hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

- Insuficiencia hepática de moderada a grave.
- Pacientes que no perciben la sensación de sed.
- Embarazo o lactancia pues no hay experiencia.
- Anuria (orinar muy poco) por la causa que sea.

Precauciones:

Tolvaptan produce pérdida de agua porque aumenta la producción de orina. Por lo tanto, tenga fácil acceso a agua y beba cantidades suficientes de agua u otro líquido sin alcohol cuando sienta sed.

En pacientes con obstrucción del flujo urinario, como en hipertrofia de próstata, tienen mayor riesgo de retención de orina.

Pacientes con hiperuricemia (gota), ya que puede aumentar los niveles de ácido úrico.

Puede interferir con el metabolismo de la glucosa. Si usted padece diabetes (sobre todo tipo II) debe controlarse los niveles con frecuencia. Este medicamento contiene lactosa.

¿Qué efectos adversos puede tener?

Sed y sequedad de boca son los más frecuentes. También puede producir náuseas, orinar con más frecuencia, cansancio, menor apetito, estreñimiento, hiperuricemia e hipotensión postural (tensión arterial baja cuando la persona se pone de pie).

Puede causar problemas del hígado, incluyendo insuficiencia hepática grave, por ello su médico le mandará controles periódicos. Comuníquese de inmediato con él si presenta cualquiera de estos indicios y síntomas de problemas hepáticos:

- ✓ Náuseas y/o vómitos que no se quitan con nada.
- ✓ Fiebre, malestar, cansancio inusual
- ✓ Picazón excesivo sin otra causa aparente
- ✓ Coloración amarillenta de la piel o la esclerótica de los ojos (ictericia)
- ✓ Oscurecimiento inusual de la orina
- ✓ Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen, donde se encuentra el hígado

Igualmente avise ante síntomas de que los niveles de sodio se están recuperando demasiado rápido: problemas para hablar o tragar, confusión, problemas musculares,...

Interacciones con otros medicamentos:

Los niveles en sangre de TOLVAPTAN pueden verse alterados de forma considerable si se toma con otros medicamentos como ketoconazol, itraconazol, voriconazol, claritromicina, ciprofloxacino, colchicina, diltiazem, rifampicina, hipérico o hierba de san Juan, digoxina, antiepilépticos como fenitoína, fenobarbital o carbamacepina,...

**CONSULTE SIEMPRE QUE VAYA A TOMAR ALGÚN MEDICAMENTO,
PRODUCTO DE HERBORISTERÍA O COMPLEJOS VITAMÍNICOS**