

SABÍA
QUE...

Vancomicina es un antibiótico peptídico que, por vía oral, se usa para tratar diarreas o colitis ocasionadas por una bacteria llamada *Clostridium difficile*. Estas infecciones se producen generalmente por la toma excesiva de otros antibióticos.

Cuando hay tratamientos antibióticos muy prolongados, se elimina al resto de bacterias de nuestra flora normal intestinal y se impone *Clostridium difficile* provocando la infección. **Es muy importante evitar el abuso de antibióticos**

Cómo tomarlo

La pauta habitual dependerá de la persona y de la gravedad de la infección. Así va desde 125 mg cada 6 horas a 250 mg cada 8 horas. Generalmente la duración del tratamiento es de 10 días. Debe intentar que el intervalo entre dosis sea lo más exacto posible

En cualquier caso debe seguir siempre la pauta indicada por su médico.

Sus síntomas pueden mejorar antes de que la infección esté completamente curada, pero es importante completar el tiempo total del tratamiento

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. **No tome nunca una dosis doble** para compensar las olvidadas.

Precaución

Consulte a su médico si está embarazada o en período de lactancia. La absorción del medicamento es muy baja y no se espera ningún efecto sobre el feto o el lactante; no obstante no hay mucha experiencia.

No dar en pacientes alérgicos a vancomicina y debe administrarse con precaución en pacientes alérgicos a otro antibiótico llamado teicoplanina ya que se han detectado reacciones alérgicas cruzadas.

No usar si:

Si tiene alergias al principio activo, a alguno de sus excipientes (celulosa microcristalina + sílice coloidal) o a fármacos de su grupo.

Si durante el tratamiento con vancomicina tiene lugar una reacción alérgica grave, debe interrumpir el tratamiento y adoptar las medidas adecuadas.

Efectos adversos

Este medicamento actúa a nivel local, sobre el intestino, por lo que no se esperan los efectos adversos de su administración sistémica. Suele ser bien tolerado pero no obstante, pueden aparecer síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Comuníquese a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Si experimentara algún efecto adverso grave como signos de infección, signos de hipersensibilidad o cualquier otra cosa póngase en contacto con su médico

Interacciones

Administrada por vía oral la vancomicina no debe tomarse con colestiramina o colestipol (resinas de intercambio aniónico utilizadas en hipercolesterolemia), porque puede verse alterada su absorción. Debe espaciar la toma de ambos al menos 3 o 4 horas.

Si está tomando otros medicamentos para cortar la diarrea consulte si debe continuar con ellos. En el caso de probióticos espácielos también dos horas.

Dada su escasa absorción sistémica tampoco se espera ninguna otra interacción.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.