

SABÍA QUE...

Lanadelumab es un fármaco utilizado para prevenir las crisis de angioedema en adultos y adolescentes mayores de 2 años que padecen angioedema hereditario. Se trata de un inhibidor de la calicreína que, en última instancia, actúa disminuyendo la cantidad de bradicinina en el torrente sanguíneo, lo que previene la hinchazón y el dolor que puede causar el angioedema hereditario.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

El angioedema hereditario es una enfermedad provocada por un déficit del inhibidor del complemento (grupo de proteínas de la sangre) C1. Puede limitar su actividad diaria al provocar episodios de hinchazón y dolor en diferentes partes del cuerpo como pueden ser manos y pies, cara, lengua, párpados y labios, laringe, genitales, estómago e intestino. Esta hinchazón suele ser similar a la de la urticaria, pero se presenta debajo de la piel en vez de la superficie.

Este tratamiento NO cura la enfermedad. El objetivo es preventivo: reducir la frecuencia, intensidad y duración de las crisis, mejorando así la calidad de vida y reduciendo el impacto de la enfermedad en la actividad diaria del paciente.

Posología

La dosis recomendada en adultos es una jeringa de 300 mg vía subcutánea cada 28 días. No obstante su médico le podría indicar una frecuencia distinta. La dosis en niños de menos de 40 kg es de 150 mg cada 28 días. Siga siempre **las instrucciones de su médico**

Qué hacer si ha olvidado una dosis

- Póngasela lo antes posible. Puede volver a sus fechas habituales si le es más cómodo, pero nunca debe ponerse dos jeringas con un período menor de:
 - 10 días entre una dosis y otra en régimen de dosificación cada 2 semanas
 - 17 días entre una dosis y otra en régimen de dosificación cada 3 semanas
 - 24 días entre una dosis y otra en régimen de dosificación cada 4 semanas.

No utilizar en caso de...

De alergia a lanadelumab o cualquiera del resto de componentes de Takhzyro®

Precauciones

En caso de embarazo o lactancia materna háblelo con su médico para valorar entre ambos los beneficios y los posibles riesgos.



- La vía de administración de lanadelumab es **subcutánea**.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.

Es importante preparar la medicación en un espacio limpio y llevar a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. NO utilice NINGUNA FUENTE DE CALOR para ello.



JERINGA: Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

Efectos adversos

En general se tolera bien pero puede presentarse, sobre todo al principio:

- Reacción en el punto de inyección
- Mareos
- Molestias musculares
- Erupciones cutáneas y picor

Si notase algún efecto secundario grave **avise a su médico** que podría tratarse de una reacción alérgica.

Interacciones

Debido a su farmacocinética no se esperan interacciones con otros fármacos de tipo farmacocinético

Pero recuerde que los pacientes con angioedema hereditario deben evitar estrógenos, antihipertensivos del grupo de los IECAs, antidiabéticos inhibidores de DPP-IV (gliptinas) o vacunas frente a hepatitis.

Más información en

<https://angioedema-aedaf.haei.org/>

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos