

SABÍA QUE...

Eltrombopag es una proteína artificial que aumenta la producción de plaquetas en su cuerpo, para disminuir el riesgo de sangrado debido a la falta de éstas. Está indicado en pacientes con Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) crónica que no responden a otros tratamientos. Y también se usa para tratar la anemia aplásica en adultos que igualmente no han tenido éxito con otros tratamientos.

El **objetivo** es mantener el número de plaquetas por encima de **50.000** para minimizar así el riesgo de sangrado.

Dosis y cómo tomarlo

- La dosis varía en función del número de plaquetas, con lo cuál su médico se la irá ajustando a sus necesidades. Aténgase siempre a las instrucciones de su médico. A continuación le hemos puesto la dosis exacta de cada día.
- Debe tomarlo **DOS HORAS ANTES** o **CUATRO HORAS DESPUÉS** de:
 - ✓ Leche o derivados lácteos: batidos, yogur, mantequilla, helados,...
 - ✓ Suplementos de calcio
 - ✓ Antiácidos o laxantes que contengan sales de aluminio o magnesio
 - ✓ En general cualquier preparado o multivitamínico que tenga hierro, zinc, selenio,...
- NO debe tomar tampoco zumo de **POMELO** durante el tratamiento.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Dosis	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg

¿Qué hacer si...

Si **ha olvidado su dosis** tómela tan pronto como sea posible mientras no hayan pasado más de 12 horas; si así fuera, espere a la siguiente toma y continúe con su horario habitual. **NO TOME NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar olvidos.

Si **vomita** repita la dosis sólo si han transcurrido menos de 30 minutos de la toma.

No tome Revolade si...

- ... es alérgico a eltrombopag o alguno de los excipientes
- ... está embarazada o en período de lactancia (en caso de estar en edad fértil debe utilizar medidas anticonceptivas seguras).

Precauciones:

- Si ha tenido o tiene algún problema en el hígado.
- Si sufre cataratas.
- Si está tomando anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva
- Si tiene aumentado el riesgo de sufrir un trombo: reciente intervención quirúrgica, ha estamos encamado mucho tiempo.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.

Reacciones adversas:

Durante el tratamiento con eltrombopag pueden aparecer, que no en todos los pacientes aparecen, reacciones adversas que incluyen:

- Dolor de cabeza o insomnio.
- Molestias gastrointestinales (náuseas, diarrea,..) o pérdida de apetito
- Sensación de hormigueo o adormecimiento de extremidades.
- Cansancio, fatiga e hinchazón de manos, tobillos o pies.
- Mayor frecuencia de infecciones leves.
- Cataratas, ojo seco.
- Erupción cutánea, picor y caída del cabello
- Molestias musculares o de articulaciones.

Informe inmediatamente a su médico si tiene alguno de los estos síntomas.

Reacción alérgica grave, coloración amarillenta de piel u orina más oscura de lo normal, si presenta hinchazón en piernas dolorosa y que desprende calor, si quedara embarazada durante el tratamiento, en caso de sobredosis y ante cualquier efecto adverso grave que le ocurra mientras está tomando el fármaco.

Interacciones de la ciclosporina con otros medicamentos:

Eltrombopag puede interaccionar con muchos fármacos. A modo de ejemplo;

Metroxato, estatinas para el colesterol o fármacos para los triglicéridos, algunos antibióticos como ciprofloxacino, rifampicina o trimetoprim, propafenona o ciclosporina. Y como se dijo antes complejos vitamínicos, laxantes o antiácidos con cationes divalentes.

ES MUY IMPORTANTE que nos consulte siempre que le prescriban un medicamento, planta medicinal o complejo vitamínico nuevo.