

SABÍA  
QUE...

**Filgrastim** es un medicamento del grupo de “factores estimulantes de colonias” (G-CSF) y se utiliza para estimular la producción de glóbulos blancos en la médula ósea, sobre todo neutrófilos..

Está indicado para la reducción de la duración e incidencia de la neutropenia en pacientes tratados con quimioterapia.

### Presentaciones y posología

Se presenta en jeringas precargadas, de 30 y 48 MUI.

Se administra a las 24-48 horas posteriores a la finalización de la quimioterapia. La dosis habitual es de 30 MUI (3-7 jeringas) los días posteriores a cada ciclo de quimioterapia. Aunque también, tiene indicaciones en Hematología pueden indicarle alguna pauta independientemente de los ciclos.

La pauta de administración puede variar de un paciente a otro, por lo que debe seguir exactamente las instrucciones dadas por su médico.

Administrar preferentemente por la tarde-noche.

Si olvida una dosis y no han pasado 12 horas póngasela, pero si ya está más cerca de la siguiente dosis espere a ésta. NUNCA doble dosis para compensar un olvido.

### No usar en caso de:

- Si usted es alérgico a FILGRASTIM, así como a cualquiera de los componentes del inyectable. Hay marcas que contiene sorbitol y jeringas cuyo protector es un derivado del látex
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

### Efectos adversos:

- Síndrome pseudogripal: dolor muscular y óseo, de cabeza, mal cuerpo y febrícula. Puede tomar paracetamol para paliar la febrícula. Si fuese fiebre alta aténgase a las instrucciones que le haya dado su médico.
- Reacción en el lugar de inyección: enrojecimiento, picor, inflamación, dolor.
- Cansancio, pérdida del apetito
- Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea
- Tos

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea puede estar relacionado con la medicación.



### Forma de administración

- La vía de administración es subcutánea.
- Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con tranquilidad, sin prisas.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de las articulaciones, los nervios o los huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.

Antes de la administración, deje la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. NO utilice ninguna FUENTE DE CALOR para ello. NO agite la jeringa.



Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

### Precauciones

- No administrar el mismo día de la quimioterapia
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse

### Avisos rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, ahogo, ...)
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > alta (38°C), dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes
- Dificultad para respirar o palpitaciones
- Dolor intenso parte derecha del abdomen
- En caso de sobredosis.

Conservar en nevera (2-8°C) y protegido de la luz. No congelar.  
Tiene una estabilidad fuera de nevera (25°C) de un máximo de 15 días