

SABÍA QUE...

Pegfilgrastim es un medicamento del grupo de “factores estimulantes de colonias” (G-CSF) y se utiliza para estimular la producción de glóbulos blancos en la médula ósea, sobre todo neutrófilos. Se trata de una forma de liberación sostenida de filgrastim que posibilita la administración de una única dosis en cada ciclo

Está indicado como profilaxis para la reducción de la duración e incidencia de la neutropenia en pacientes tratados con quimioterapia cuando se requieran dosis altas de filgrastim

Posología

Se administra a las 24-48 horas posteriores a la finalización de la quimioterapia.

También pueden indicarle alguna pauta independientemente de los ciclos.

La pauta de administración es de una única inyección por ciclo de quimioterapia.

Administrar preferentemente por la tarde-noche.

Es primordial que no se olvide ponérsela en la fecha que le indiquen, el momento de inicio de la acción es muy importante .

No usar en caso de:

- Si usted es alérgico a PEGFILGRASTIM, así como a cualquiera de los componentes de la solución
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si es alérgico al látex: la cubierta de la aguja contiene caucho natural

Precauciones

- No administrar el mismo día de la quimioterapia ni en las 24 horas previas.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Si es intolerante a la fructosa: contiene sorbitol.

Forma de administración



- La vía de administración es subcutánea.
- Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con tranquilidad, sin prisas.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de las articulaciones, los nervios o los huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalga.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta..

Antes de la administración, deje la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. NO utilice ninguna FUENTE DE CALOR para ello. NO agite la jeringa.



Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante

Efectos adversos:

• Lo que más se ha descrito son **náuseas o síndrome pseudogripal**, que consiste en dolor muscular y óseo, de cabeza, mal cuerpo y febrícula. Puede tomar paracetamol para paliar la febrícula. Si fuese fiebre alta atégase a las instrucciones que le haya dado su médico.

Reacción en el lugar de inyección: enrojecimiento, picor, inflamación, dolor.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, ahogo, ...)
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre alta (>38°C), dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en orina o hematomas importantes
- Dificultad para respirar o palpitaciones fuertes
- Dolor intenso parte derecha del abdomen
- En caso de sobredosis.

Conservar en nevera (2-8°C) y protegido de la luz. No congelar.
Tiene una estabilidad fuera de nevera (25°C) de un máximo de 72 horas