

¿ Qué es y para qué se utiliza ?

Estos medicamentos se emplean como tratamiento para la hepatitis C, que es una infección del hígado ocasionada por un virus.

EPCLUSA® es una combinación de dos principios activos (sofosbuvir y velpatasvir) que actúan inhibiendo la replicación del virus y la formación de nuevos viriones por distinto mecanismo de acción.

Posibles efectos adversos

En general se tolera muy bien (nada que ver con los antiguos tratamientos); no obstante podría aparecer:

- Dolor de cabeza o mareos
- Cansancio
- Erupciones cutáneas o prurito
- Anemia
- Reacciones alérgicas
- Aumento de la sensibilidad a la luz

Interacciones:









Epclusa® interacciona con los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, esomeprazol...), por lo que debe utilizar en su lugar antagonistas H2 (famotidina) separando las tomas 12 h. Si toma un antiácido, hágalo 4 h antes o 4 h después de tomar Epclusa®. Si se considera imprescindible la administración concomitante con omeprazol, entonces Epclusa se debe administrar con alimentos y se debe tomar 4 horas antes del inhibidor de la bomba de protones a dosis máximas similares a omeprazol 20 mg.

Puede también aparecer interacción con otros medicamentos, como estatinas (simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina). Evite la ingesta de zumo de pomelo. Debe consultar a su farmacéutico o médico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta, productos de herboristería, suplementos dietéticos y plantas medicinales.

No utilizar después de la fecha escrita en el envase.
Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Este díptico **NO** contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

	AL LEVANTARSE	DESAYUNO			COMIDA			MERIENDA			CENA		ANTES DE ACOSTARSE	
														
Tratamiento	8	9	10	11-12-13	14	15	16	17	18	19-20	21	22	23	24
														

•• Epclusa® ••

La dosis habitual de Epclusa® es de **1 comprimido al día**, administrado por vía oral durante 12 semanas. Tómelo aproximadamente a la misma hora todos los días. Tragar el comprimido completo acompañado o no de alimentos, sin masticar ni partir. En caso de tener problemas para tomarlo informe a su médico o farmacéutico.

¿Qué hacer si se ha olvidado una dosis?

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

¿Qué hacer si vomita?

Si usted vomita en un plazo de 2 horas después de la administración de este medicamento, debe tomar un comprimido adicional. Si han pasado más de 2 horas, no es necesario tomar ninguna dosis adicional.

