

# ¿ Qué es y para qué se utiliza ?

Estos medicamentos se emplean como tratamiento para la hepatitis C, que es una infección del hígado ocasionada por un virus.

**MAVIRET®** es una combinación de dos principios activos (glecaprevir y pibrentasvir) que actúan inhibiendo la replicación del virus y la formación de nuevos viriones por distinto mecanismo de acción.

## Posibles efectos adversos

En general se tolera muy bien (nada que ver con los antiguos tratamientos); no obstante podría aparecer:


- Dolor de cabeza
- Cansancio y debilidad
- Molestias intestinales

## Interacciones:

Maviret® interacciona con muchos medicamentos. No debe tomar Maviret si toma atazanavir (VIH), atorvastatina o simvastatina (colesterol), carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona (epilepsia), anticonceptivos orales que contengan etinilestradiol, rifampicina (antibiótico), dabigatrán (anticoagulante) e hierba de San Juan (hipérico).

Además presenta interacciones con inhibidores de la bomba de protones (omeprazol), inmunosupresores (ciclosporina, tacrolimus), digoxina (insuficiencia cardíaca), ritonavir, lopinavir, efavirenz, darunavir (VIH).

Debe consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta, productos de herboristería, suplementos dietéticos y plantas medicinales.

	AL LEVANTARSE		DESAYUNO		COMIDA			MERIENDA		CENA		ANTES DE ACOSTARSE		
Tratamiento	8	9	10	11-12-13	14	15	16	17	18	19-20	21	22	23	24
		NXT												

## · Maviret® ·

La dosis habitual de Maviret® es de **3 comprimidos al día en una toma** administrado por vía oral y tras una comida. Es importante tomarlo con alimentos e intente que sea a la misma hora aproximadamente.

Tragar el comprimido completo acompañado de alimentos, sin masticar ni partir. En caso de tener problemas para tomarlo informe a su médico o farmacéutico.

Si tomara un protector gástrico (omeprazol, pantoprazol,...) debe hacerlo a la vez o un poco después (10-15 min) del Maviret y no sobrepasar los 20 mg de omeprazol/día. No ocurre con otros inhibidores de la bomba de protones

La duración del tratamiento dependerá de factores como el genotipo y el grado de afectación. Aténgase siempre a lo que le indiquen y termine siempre el tratamiento

## ¿Qué hacer si se ha olvidado una dosis?

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si pasan 18 horas desde la última dosis, en ese caso espere a la siguiente.

No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

## ¿Qué hacer si vomita?

Si usted vomita en un plazo de 3 horas después de la administración de este medicamento, debe tomar un comprimido adicional. Si han pasado más de 3 horas, no es necesario tomar ninguna dosis adicional.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

Contiene lactosa

No utilizar después de la fecha escrita en el envase.  
Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.  
Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.