

SABÍA
QUE...

Griseofulvina es un medicamento antifúngico de naturaleza antibiótica, sintetizado por *Penicillium griseofulvum*. Interfiere con la síntesis de la pared celular y con el metabolismo de los ácidos nucleicos de los hongos, deteniendo el crecimiento del mismo. Es eficaz contra muchas especies de dermatofitos, entre ellos los que causan la tiña.

Se usa en infecciones fúngicas de la piel, cuero cabelludo o uñas, cuando la terapia tópica se considera inapropiada o no haya sido efectiva. Griseofulvina permite que la queratina recién formada de la piel, cabello y uñas resista el ataque de los hongos: a medida que se extiende la queratina nueva se va desprendiendo la queratina vieja infectada.



Cómo debo tomarlo



GRISEOFULVINA se administra por vía oral y la dosis dependerá del tipo de infección y del peso del paciente, pero oscilan entre 500 a 1000 mg al día

Habitualmente se toma en una sola toma diaria, pero algunos pacientes pueden necesitar dividirlo en dos tomas para favorecer la absorción.

Debe tomarse también después de una comida con suficiente contenido graso para una mejor absorción

En cualquier caso atégase a lo que le indique su médico, tanto en dosis como en la duración del tratamiento.

NO DEBE TOMAR ALCOHOL mientras dure el tratamiento

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómesela tan pronto como sea posible, pero si ya han pasado más de la mitad del tiempo entre tomas espere a la siguiente. **NUNCA** tome una dosis doble para compensar las olvidadas.

Si vomita recién tomado el comprimido vuelva a tomarlo. Si ha pasado ya un tiempo no repita la dosis.

– En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico –

Contraindicaciones y precauciones

- No tomar si usted es alérgico a griseofulvina o alguno de los componentes.
- No debe tomarlo si está embarazada o en período de lactancia. Se han demostrado efectos sobre el feto en animales de experimentación. Las mujeres no deben quedar embarazadas incluso UN MES después de acabar el tratamiento. Igualmente, los hombres no deben engendrar hijos en los SEIS MESES después de acabar el tratamiento. Se deben adoptar dobles métodos anticonceptivos.
- Porfiria, lupus eritematoso o enfermedad hepática grave

Precaución

Si toma el sol es muy importante que use una PROTECCIÓN SOLAR ALTA

Efectos adversos

En general se tolera bien, aunque podría aparecer:

- Dolor de cabeza o mareos o algo de insomnio
- Molestias gastrointestinales: malestar estomacal, náuseas,...
- Cansancio
- Produce fotosensibilidad de la piel

AVISE RÁPIDAMENTE A SU MÉDICO en caso de notar reacción alérgica grave, de aparecer una reacción cutánea grave, confusión o cualquier otro efecto adverso de importancia

Interacciones con otros fármacos como:

Puede interaccionar con bastantes medicamentos, haciendo que tengan menos efecto. A modo de ejemplo

- Anticonceptivos orales (muy importante adoptar otra medida profiláctica).
- Ranolazina, fármacos para el colesterol, anticoagulantes, algunos analgésicos, citoatáticos, hipnóticos, inmunosupresores, etcétera

Es importante que consulte a su farmacéutico o médico antes de tomar un nuevo medicamento, complejo vitamínico o planta medicinal.