

SABÍA
QUE...

Dapsona es una sulfona, sustancia relacionada químicamente con el del grupo de las sulfamidas, con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Algunas presentaciones contienen oxalato de hierro para reducir el riesgo de anemia hipocrómica asociado ocasionalmente a la dapsona

Aunque no se ha esclarecido el mecanismo de acción exacto, se ha demostrado su eficacia tanto en procesos infecciosos (es el tratamiento tradicional de la lepra) como en algunas enfermedades inflamatorias crónicas: dermatosis ampollosas, pénfigo vulgar, psoriasis pustulosa, exacerbaciones del lupus eritematoso, etcétera.



Cómo debo tomarlo



DAPSONA se administra por vía oral. Generalmente se toma una vez al día, pero la pauta y la duración del tratamiento recomendada depende de la indicación. Atégase exactamente a lo que su médico le haya prescrito.

Los comprimidos deben tomarse enteros, sin chuparlos en la boca ni masticarlos ni disolverlos, preferiblemente después de una comida y acompañados de un buen vaso de agua.

Mantenga siempre el mismo horario.

Recuerde que debe **proteger de la luz** los comprimidos.

Recuerde también realizarse las analíticas que pueda mandar su médico

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómesela tan pronto como sea posible, pero si ya han pasado más de la mitad del tiempo entre tomas espere a la siguiente. **NUNCA** tome una dosis doble para compensar las olvidadas.

Si vomita recién tomado el comprimido vuelva a tomarlo. Si ha pasado ya un tiempo no repita la dosis.

– En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico –

Contraindicaciones y precauciones

No tomar si usted es alérgico a DAPSONA o alguno de los componentes de los comprimidos. Tampoco debe tomarla si es alérgico a fármacos relacionados como las sulfamidas.

No tomar si está embarazada o en período de lactancia.

Evitar también las personas con déficit de G6DP.

Precaución en pacientes con anemia y/o con enfermedad hepática grave.

Si **toma el sol** deberá usar una protección alta.

Este medicamento contiene lactosa.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse

Efectos adversos

En general se tolera bien, aunque podría aparecer:

- Lo más llamativo, que no tiene mayor repercusión, es coloración de la piel, de las lesiones, del cabello, de la córnea y en general de los fluidos corporales. Esto es reversible, aunque en el caso de la piel puede durar un poco más
- Molestias gastrointestinales
- Algo de cansancio por anemia

Su médico le pedirá periódicamente controles del recuento de glóbulos rojos y de leucocitos.

AVISE RÁPIDAMENTE A SU MÉDICO en caso de notar síntomas de reacción alérgica (dificultad para respirar, hinchazón de cara o labios, ...) coloración azulada en labios y uñas, si tiene problemas de visión o si tiene mucho cansancio.

Interacciones con otros fármacos como:

No tiene demasiadas interacciones con otros fármacos pero advierta a su médico si toma también

- Rifampicina
- Pirimetamina
- Otros fármacos que puedan producir anemia

En cualquier caso **no olvide consultar a su farmacéutico o médico ante cualquier duda o si le recetan algún tratamiento nuevo.**