

SABÍA
QUE...

Valganciclovir es un fármaco antiviral. En el organismo se metaboliza a ganciclovir. Éste previene que el virus llamado citomegalovirus (CMV) se multiplique e invada las células sanas. En pacientes con un sistema inmune debilitado, el CMV puede causar una infección en distintos órganos del cuerpo.

¿Cómo debo tomarlo?

La dosis habitual es

- en tratamiento es de 900 mg (DOS COMPRIMIDOS) dos veces la día
- en profilaxis es de 900 mg (DOS COMPRIMIDOS) una vez la día

No obstante siga las indicaciones de su médico

Por vía oral. Se debe tomar los comprimidos con alimentos, y tomarlos enteros, sin masticar, romper ni triturar.

Es muy importante que no abandone el tratamiento aunque se encuentre mejor.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, siempre que no hayan pasado más de 6 horas. En caso contrario espere a la siguiente toma.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

No debe tomar valganciclovir si:

- Es alérgico al producto o a ganciclovir, aciclovir o valaciclovir. Existe alergia cruzada entre ellos.
- Está embarazada o en periodo de lactancia: Riesgo de teratogenicidad. Las mujeres en edad fértil deben utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento. Los hombres deben utilizar anticonceptivos de barrera durante y hasta por lo menos, 90 días después del tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se desconoce si se excreta en la leche materna, por lo que dado el caso se debe interrumpir la lactancia..

Debe tener especial precaución si:

- Padece un trastorno de células de la sangre (como la anemia o niveles bajos de plaquetas en la sangre).
- Si está recibiendo radioterapia o hemodiálisis.
- Si tiene problemas con los riñones. Su médico puede que le prescriba una dosis menor y puede necesitar análisis de sangre frecuentes durante el tratamiento.
- Su médico le programará controles periódicos de sangre. Es importante no faltar a ellos para evitar efectos adversos

Efectos adversos más frecuentes:

No los padece todo el mundo y suelen desaparecer tras los primeros días

- Diarrea, estreñimiento o malestar estomacal
- Anemia. También disminución de glóbulos blancos
- Pérdida del apetito
- Dificultad para respirar (disnea)
- Dolor de cabeza o de ojos.
- Alteraciones del gusto

Avisé rápidamente a su médico si tiene: una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar o signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.

Interacciones con otros medicamentos:

Aumenta la posible toxicidad renal o hematológica de: micofenolato mofetilo, trimetoprima, dapsona, pentamidina, flucitosina, vincristina, vinblastina, adriamicina, amfotericina B, análogos de nucleósidos, hidroxiurea, cidofovir, foscarnet o tenofovir.

**Recuerde consultar a su farmacéutico o médico
si le recetan algún tratamiento nuevo**