









## Fármacos que pueden formar parte de distintos regímenes de tratamiento

### HORARIO DE SU TRATAMIENTO

HORAS	8 	Desayuno 	11	12	Comida 	16	17	Merienda 	19	20	Cena 	23	Al acostarse 
		2									2		
<p><b>Delamanid (Deltabya)</b> es un fármaco que inhibe la síntesis de la pared celular de las micobacterias. Tome 2 comprimidos en el desayuno y 2 en la cena durante 24 semanas. Es importante que los tome con alimentos. El tratamiento no debe durar más de ese tiempo aunque le indiquen que debe continuar un tiempo más con el resto. Advierta a su médico si tiene problemas con el ritmo cardiaco. Puede prolongar el intervalo QT del electrocardiograma. Por ese motivo es importante que comunique a cerca de los medicamentos o plantas medicinales que tome ya que este riesgo se aumenta si se toman conjuntamente dos fármacos que posean el mismo efecto. En cuanto a los efectos adversos los más frecuentes son gastritis, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, pérdida de apetito y alteraciones del sueño. Si nota palpitaciones o algún otro efecto coincidiendo con la toma del medicamento advierta a su médico o farmacéutico.</p>													
		2									2		
<p><b>Cicloserina (Cicloserina Atb)</b> es un fármaco que inhibe la síntesis de la pared celular de determinadas bacterias, entre ella las micobacterias Tomar dos comprimidos dos veces al día. Si su riñón no funcionara al 100% esta dosis será más baja. Aténgase siempre a lo que le indiquen. <b>NO DEBE TOMAR ALCOHOL</b> durante el tratamiento. Está contraindicado en epilepsia, insuficiencia renal grave, problemas mentales graves y en dependencia del alcohol. Los efectos secundarios más frecuentes son molestias gastrointestinales, fotosensibilidad, hormigueo y trastornos del SNC: somnolencia, confusión, depresión. Si va a conducir o manejar maquinaria peligrosa tenga cuidado sobre todo al principio del tratamiento. Aunque este medicamento no tiene demasiadas interacciones farmacológicas con otros informe siempre de su tratamiento de casa porque siempre va a formar parte de un régimen de más de dos fármacos.</p>													



1

Clofazimina 100 mg (Lampren) es un antibiótico que inhibe el crecimiento y la replicación de algunas bacterias como las que causan la tuberculosis o la lepra. Hay que tomar un comprimido una vez al día con una comida o con leche, en el desayuno por ejemplo. El efecto adverso más frecuente es la diarrea, pero también puede aparecer picor y coloración marrón de la piel, córnea y fluidos corporales, que es reversible. Las cápsulas de clofazimina, por contener butilhidroxitolueno de excipiente, puede ser irritante de ojos, piel y mucosas, así que no deben abrirse sino tomar enteras. Si esto ocurriera lávese bien las manos. En caso de que la diarrea o vómitos perduren póngase en contacto con su médico o farmacéutico. E igualmente si nota algún otro efecto adverso.



2



1

**Levofloxacin y moxifloxacin** son antibióticos del grupo de las quinolonas, que se pueden usar en caso de TBC resistentes. Levofloxacin se deben tomar 2 comprimidos de 500 mg al día (aunque también podría tomar 1 comprimido cada 12 horas según le sea más apropiado), mientras que la dosis de moxifloxacin es 1 solo comprimido de 400 mg al día. Si toma antiácidos o cualquier sal de hierro aluminio o magnesio tendrá que espaciar dos horas la administración de ambos. Advierta a su médico si ha tenido antecedentes de tendinitis con el uso de quinolonas. En tratamientos largos como éste debería evitarse levofloxacin y tener precaución con moxifloxacin en caso de epilepsia y al contrario si tiene problemas con el ritmo cardiaco: preferible levofloxacin pero con precaución. Al primer signo de dolor o inflamación de un tendón (tobillo, muñeca, codo, hombro o rodilla), deje de tomarlos, póngase en contacto con su médico y mantenga en reposo la zona dolorosa. Evite cualquier ejercicio innecesario, ya que este podría aumentar el riesgo de rotura de un tendón. Póngase en contacto también con su médico o farmacéutico ante cualquier otro efecto adverso que pueda notar.

**Estos medicamentos forman parte de tratamientos combinados, nunca se utilizan solos en tuberculosis.  
No olvide nunca detallar sus tratamientos habituales, ya que son frecuentes las interacciones farmacológicas,  
Que pueden hacer que los fármacos no obtengan el efecto deseado o que aparezcan reacciones adversas  
No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo**

**¡Recuerde que, durante el tratamiento, debe utilizar métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo. Y deben utilizarse hasta 30 días después de la toma de la última pastilla!**

**SI SE OLVIDA ALGUNA TOMA.....**

..... y no ha pasado mucho tiempo tómatela.

.....y si está más cerca de la próxima toma, sigue con tu horario normal pasando a la siguiente toma.

**¡¡ NUNCA TOMES EL DOBLE EN LA SIGUIENTE TOMA!!**

**SI VOMITAS LAS PASTILLAS** intenta tomarlas de nuevo.

- Si ves que no puedes y te sucede con frecuencia explícaselo a tu médico o farmacéutico: existen formas de reducir las náuseas y vómitos.

Y recuerda.....

**La tuberculosis**  
**SE CURA**  
**Si terminas el tratamiento**