

SABÍA
QUE...

Tedizolid es un antibiótico que actúa deteniendo el crecimiento bacteriano, con un espectro de actividad reducido, por lo que solo debe utilizarse frente a gérmenes que se sepa que sean sensibles.



Cómo debo tomarlo



Se administra por vía oral una vez al día y con el estómago vacío (1 hora antes de las comidas) o una comida con bajo contenido en grasas. Es **MUY IMPORTANTE** tomarlo siempre a la misma hora aproximadamente. La duración del tratamiento suele ser de 6 días, pero depende de la infección a tratar. Tómela durante el tiempo exacto que le indique su médico.

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Si aún **NO han pasado 8 horas**: tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual.

Si han pasado **más de 8 horas** desde el olvido tómela y cambie el horario a partir de ese momento o espere a la siguiente toma.

NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido.

No tome Sivextro si:

Si usted es alérgico a TEDIZOLID o a alguno de los excipientes.

Precauciones:

En embarazo o lactancia habrá que valorar el beneficio/riesgo

Si tiene bajo el número de neutrófilos puede que le haga menos efecto.

Si tiene en general problemas hematológicos

Si ha padecido diarreas por Clostridium difficile

Efectos adversos más frecuentes:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Dolor de cabeza o mareos.
- Cansancio
- Molestias intestinales: Diarrea, náuseas
- Picor generalizado

Póngase en contacto con su médico si nota:

- Problemas de visión: agudeza visual, cambio en los colores...
- Hormigueo o dolor de extremidades
- Sangrado frecuente, hematomas o manchas debajo de la piel rojas o moradas
- **Acidosis metabólica**: vómitos y diarrea frecuente, dolor abdominal o respiración acelerada.
- **Síndrome serotoninérgico**: confusión, fiebre muy alta, sudoración, rigidez muscular, agitación, alucinaciones, etcétera.

Interacciones:

La mayoría de interacciones no están descritas en ficha técnica, pero cada vez hay más casos descritos de interacciones similares a otros medicamentos de su grupo.

Por ejemplo:

Antimigrañosos: Muy frecuente: ergotamínicos. Menos frecuente: triptanos.

Antidepresivos: IMAO, tricíclicos, ISRS

Simpaticomiméticos: broncodilatadores adrenérgicos, pseudoefedrina,

fenilpropanolamina (ojo a los antigripales)

Algunos opiáceos: petidina, buspirona, fentanilo, dextrometorfano, tramadol.

Medicamentos para evitar vómitos: metoclopramida, ondansetron, granisetron

Algunas plantas medicinales: Ginseng, hipérico

En cambio no parece que tengan interacciones con **alimentos ricos en tiramina**.

Es MUY IMPORTANTE consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo