

SABÍA QUE...

Deferiprona es un agente quelante de hierro, que se utiliza para el eliminar el exceso de hierro del organismo cuando han fracasado otras opciones. Puede usarse en monoterapia o asociado a otros quelantes durante un determinado período de tiempo.

Posología y forma de administración

La dosis total del medicamento varía de un paciente a otro, ya que va en función del peso corporal. Igualmente le podrán ir cambiando la dosis según resultados analíticos (niveles de ferritina), eficacia clínica y presencia de otros tratamientos concomitantes.

Aténgase siempre a las instrucciones de su médico y es muy importante que acuda a las revisiones para evitar la aparición de efectos adversos.

Normalmente se repartirá en tres tomas diarias. Se puede tomar con o sin alimentos, pero si le produce molestias en el estómago tómelo en tres tomas pero coincidiendo con las comidas.

Conserve los comprimidos en su envase original.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómelo tan pronto como pueda, pero sáltese la dosis que dejó de tomar si está más cerca ya de la próxima toma

NUNCA tome una DOSIS DOBLE para compensar olvidos.

Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 h desde la toma.

No usar Ferriprox®:

- * En caso de alergia a deferiprona o a alguno de los componentes.
- * Si tiene antecedentes de agranulocitosis (bajo número de determinados leucocitos) o neutropenias (neutrófilos bajos) frecuentes.
- * Embarazo o lactancia

Recuerde que durante el tratamiento, debe utilizar métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo, tanto mujeres como hombres. Y debe usarlo hasta 6 meses después de la última pastilla en caso de mujeres y 3 meses en caso de los hombres.

Precauciones

- En insuficiencia renal o hepática grave
- Precaución en pacientes inmunodeprimidos.
- En uso concomitante con otros fármacos que puedan provocar neutropenia.

Efectos adversos:

Los más frecuentes, que no quiere decir que aparezca en todos los pacientes, son:

- ✓ Náuseas o vómitos
- ✓ Dolor abdominal
- ✓ coloración rojiza/marrón de la orina motivado por la eliminación del complejo hierro-deferiprona. No debe preocuparse.
- ✓ Más raro pero también puede aparecer cansancio o dolor de cabeza
- ✓ Puede ocurrir que le disminuyan los niveles de zinc en el organismo. En ese caso le prescribirán suplementos de zinc

Awise rápidamente a su médico si tiene:

- Signos de reacciones alérgicas
- Úlceras en la piel o en la garganta
- Cualquier signo de infección grave (fiebre, escalofríos,...)
- Ante cualquier reacción grave aparte de las descritas

Interacciones:

No debe usarse junto con otros fármacos que puedan provocar también neutropenia

No usar con medicamentos que puedan tener sales trivalentes como sales de aluminio. En caso de antiácidos buscar una alternativa
Precaución cuando se tome conjuntamente con vitamina C
También debe evitar plantas medicinales como el cardo mariano

Consulte siempre con su farmacéutico o su médico ante cualquier fármaco o producto de herboristería que vaya a tomar, sobre todo cuando lo toma de forma crónica