

SABÍA QUE...

Sobre su medicación

Fenfluramina (Fintepla®) es un fármaco que se utiliza en síndrome de Dravet y en el síndrome de Lennox-Gastaut, para pacientes que no han respondido a otros tratamientos antiepilépticos. No está claro el mecanismo exacto de acción pero parece que está relacionado con la estimulación, por parte de fenfluramina, de determinados receptores de la serotonina (5-HT1D, 5-HT2A y 5-HT2C) y la modulación del receptor sigma.

El **objetivo** del tratamiento es la disminución de la frecuencia e intensidad de crisis epilépticas.

Datos de administración

Debe tomarse por vía oral cada 12 horas y la dosis irá en función del peso del paciente, de la eficacia, de la tolerancia e incluso de la toma o no de otros fármacos (estiripentol). Generalmente se empieza con una dosis de 0,1 mg/kg dos veces al día, y su médico le irá programando las nuevas dosis, generalmente con periodicidad semanal al principio, diciéndole si mantiene dosis o debe aumentarla. Aténgase siempre a lo que le digan

La cantidad exacta de **cada una de sus dosis** es:

_____ ml (_____ mg)

Fenfluramina puede tomarse con o sin alimentos pero intentando respetar en la medida de lo posible la pauta de cada 12 horas.

Es compatible con la mayoría de las sondas gástricas y nasogástricas

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela en cuanto lo recuerde, pero si ya está más cerca de la siguiente toma espere a ésta.

NO TOME UNA DOSIS DOBLE PARA COMPENSAR OLVIDOS.

Nunca debe interrumpir el tratamiento por su cuenta. En caso de interrupción debe hacerse de forma gradual para evitar rebotes

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no tienen por qué darse en todo el mundo, son:

- Disminución del apetito y pérdida de peso, que suele recuperarse con el curso del tratamiento
- Fatiga
- Somnolencia
- En algunos pacientes molestias intestinales: náuseas, diarrea o estreñimiento

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si nota alguno de estos otros:

Alucinaciones, fiebre, escalofríos, sudoración, confusión, ritmo cardiaco muy rápido, rigidez muscular, pérdida de coordinación o náuseas, vómitos o diarrea que no ceden. Póngase en contacto también si nota visión borrosa o cambios en la visión, incluyendo halos (siluetas borrosas alrededor de los objetos) o puntos de colores.

No tome FENFLURAMINA si...

- Tiene alergia al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Hipertensión arterial pulmonar o alguna valvulopatía (aórtica o mitral).
- Si ha tomado fármacos del grupo de los IMAOs en las últimas dos semanas

Precauciones

- Pacientes con glaucoma
- Es importante **evitar el alcohol** mientras esté tomando fenfluramina.
- Antecedentes de depresión grave.

Interacciones con otros medicamentos

Precaución si se usa con fármacos que puedan provocar también síndrome serotoninérgico: muchos antidepresivos, algunos fármacos para la migraña, linezolid, ciertos antigripales, fármacos para evitar náuseas, plantas medicinales como ginseng o hipérico, suplementos dietéticos como el triptófano...

El fármaco para estimular el apetito ciproheptadina puede disminuir el efecto de fenfluramina.

Otros depresores del sistema nervioso central pueden aumentar la somnolencia

Hay otros fármacos que pueden alterar sus niveles sanguíneos, por ejemplo opiáceos como fentanilo, tramadol o tapentadol, quinolonas o antituberculosos, cinacalcet, etcétera

Consulte siempre con su farmacéutico o médico ante cualquier tratamiento, complejo vitamínico o producto de herboristería que vaya a tomar