

SABÍA
QUE...

Upadacitinib (Rinvoq®) es un inhibidor potente de las enzimas Janus Quinasa (JAK1 y 3). Esta inhibición hace que se reduzca el dolor y la inflamación asociados a ciertas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, dermatitis atópica o colitis ulcerosa.

Datos de administración

- En colitis ulcerosa la dosis inicial recomendada de upadacitinib es de 45 mg una vez al día durante 8 semanas en enfermedad de Crohn ese período de inducción se alarga hasta la semana 12). Si no hay un beneficio adecuado se debe seguir otras 8 semanas con la misma dosis y se debe interrumpir si no hay respuesta a las 16 semanas.

La dosis de mantenimiento será de 15 o 30 mg una vez al día según la situación clínica del paciente, tratamientos conjuntos, ... Para mayores de 65 años por ejemplo no recomiendan superar los 15 mg diarios. En cualquier caso atégase a las indicaciones de su médico.

-Se debe tomar entero, **CON O SIN COMIDA**, pero siempre a la misma hora del día y con un buen vaso de agua.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, pero si ya han transcurrido más de 12 horas espere a la toma siguiente. **NO TOME UNA DOSIS DOBLE PARA COMPENSAR OLVIDOS**

NO TOME UPADACITINIB SI...

- presenta hipersensibilidad al fármaco o a alguno de los excipientes.
- no debe usarse durante el embarazo ni la lactancia. Las mujeres en edad fértil deben usar métodos anticonceptivos durante y al menos 7 días después de acabar el tratamiento.
- Antes de iniciar le harán analítica para ver su función hepática, el recuento de células sanguíneas y si tuviese una hepatitis B o una TBC latente.
- Se aconseja máxima precaución en mayores de 65 años, fumadores o que lo hayan sido durante un período prolongado y factores de riesgo trombóticos.
- Precaución si padece diverticulosis. Se han descrito casos de perforación intestinal, sobre todo si está tomando también antiinflamatorios, corticoides u opiáceos.

Consejos:

- Vigilar la tensión arterial al menos al principio del tratamiento
- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna **vacuna** o si le van a realizar una **intervención quirúrgica o dental**.
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique.

Avise a su médico

- ... cuando vaya a administrarse alguna vacuna.
- ... ante una intervención quirúrgica
- ... si tiene riesgo o ha padecido cáncer de piel

Efectos adversos

Las reacciones adversas más comunes son infecciones del tracto respiratorio superior. Puede aumentar los niveles de colesterol que responden bien al tratamiento con estatinas.

Otras reacciones adversas que se han descrito son:

- Náuseas, molestias intestinales y a veces cierta pérdida de peso.
- Se podría dar alguna reactivación de infecciones como herpes latentes o acné.

Avise a su médico ante la aparición de cualquiera de estos síntomas:

- Si presenta algún signo de **infecciones graves** debidas a bacterias, micobacterias, virus, hongos o patógenos oportunistas. (neumonía, herpes zoster, diverticulosis, tuberculosis, infección urinaria, candidiasis, etcétera): fiebre, escalofríos, llagas en la piel, cansancio exagerado, quemazón al orinar, diarrea, sudoración, falta de aliento, ...
- Igualmente avise a su médico si notase dolor abdominal intenso.

Interacciones con otros medicamentos:

- **Upadacitinib** no está recomendado en combinación con antirreumáticos biológicos o con potentes inmunosupresores como tacrolimus, ciclosporina, azatioprina.
- Precaución con anticonceptivos orales puede estar aumentado el riesgo de trombosis
- También tiene interacción con bastantes fármacos: algunos antiepilépticos, algunos antibióticos, ciertos citostáticos, algunos fármacos para el tratamiento de hongos, fármacos para el colesterol, algunas benzodiazepinas, etcétera

Si usted está tomando además METOTREXATO (MTX) oral o subcutáneo

El MTX reduce la inflamación por un mecanismo relacionado con el metabolismo del ácido fólico. Por eso es importante tomar un suplemento semanal de ácido fólico. Y es muy importante tomarlo **24 horas después**.

Se recomienda beber abundantes líquidos para mantener una buena hidratación y precaución con el alcohol.

Comprimidos: En una sola toma semanal: toma única o repartiéndolos en dos tomas un mismo día. Si manipula el comprimido debe utilizar guantes.

Es importante que nos consulte siempre ante cualquier tratamiento nuevo, incluidos medicamentos sin receta y plantas medicinales.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas, ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.