



HORARIO RECOGIDA

MAÑANAS (Lunes a Viernes)	8.30 a 14.00 horas
TARDES (Lunes a Jueves)	16.00 a 19.00 horas



TELÉFONOS

CONSULTAS EXTERNAS → 954 782335

LABORATORIO → 954 782302

Composición por 100 ml

Diltiazem CIH	2 g
Propilenglicol	10 ml
Excipiente o/w csp	100 ml

Hospital Universitario Virgen Macarena

PACIENTES EXTERNOS
Farmacia
HUV Macarena y Área



DILTIAZEM 2%
POMADA RECTAL



CONSEJERÍA DE SALUD

DILTIAZEM 2% POMADA RECTAL

¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

La fisura anal es una grieta asociada a un intenso espasmo del esfínter anal interno. El diltiazem se utiliza por vía tópica en este caso para disminuir la presión en reposo del esfínter anal, con lo que mejoran los síntomas.

POSOLOGÍA

Se pondrá aproximadamente 2-3 cm del gel cada 12-8 horas (según indicación del médico) sobre el dedo índice, y posteriormente se lo aplicará en el ano masajeando la zona alrededor del margen anal. La duración del tratamiento será, en principio, de unos 2 meses aunque debe atenerse a lo que le indique su médico.



¿CÓMO DEBO APLICARLO?

Aplicar en el ano masajeando la zona alrededor del margen anal y sin introducirlo en el interior para evitar que la absorción sistémica (a la sangre). Lávese las manos a continuación.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿QUÉ HACER SI OLVIDA UNA DOSIS?

Aplique la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde; sin embargo, si ya está más cerca la siguiente aplicación, espere y siga con la dosificación habitual. Nunca se aplique una dosis doble para compensar la que olvidó. .

ALGUNOS EFECTOS ADVERSOS SON...

No llega en mucha cantidad a sangre, con lo que los efectos adversos más frecuentes suelen ser leves; no obstante se han descrito:

- ...escozor o picor en la zona perianal
- ...dolor de cabeza
- ...ligeros mareos

INTERACCIONA CON...

Como hemos dicho no tiene mucha absorción sistémica, por lo que no se esperan muchas interacciones.

Llegado el caso podría potenciar el efecto hipotensor de otros fármacos como beta-bloqueantes, diuréticos o cualquier otro fármaco con efecto vasodilatador

Consulte con su farmacéutico o médico antes de utilizar cualquier medicamento o producto natural.

CONTRAINDICACIONES. PRECAUCIONES

No utilice este medicamento si tiene alergia al principio activo (diltiazem) o a cualquiera de sus excipientes.

En ancianos se recomienda un especial control clínico, ya que son más susceptibles al efecto hipotensor, pudiendo necesitar menores dosis iniciales.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de administrarse este medicamento.

CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (2-8°C)
Proteger de la luz y de la humedad.



CADUCIDAD

No utilizar después del plazo de validez o la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque tengan síntomas similares.