

SABÍA QUE

Acalabrutinib es un **antineoplásico** (inhibidor de la tirosina quinasa) que impide el crecimiento de las células tumorales, utilizado en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC). Acalabrutinib **actúa bloqueando la tirosina quinasa de Bruton**, una proteína del cuerpo que ayuda a las células cancerosas a crecer y sobrevivir. Bloqueando esta proteína, acalabrutinib ayuda a destruir y reducir el número de células del cáncer. Puede ralentizar también el empeoramiento del cáncer.

Para qué se utiliza

Para el tratamiento de la LLC, un cáncer de los glóbulos blancos llamados linfocitos B (o células B). Estas células forman parte del sistema inmune (las defensas del cuerpo).

Posología y forma de administración

➤ Acalabrutinib se administra **con o sin alimentos**, una cápsula de 100 mg vía oral **dos veces al día**, dejando un intervalo de 12 horas entre toma y toma. Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar ni chupar en la boca. Si tiene problemas para tragarlo puede contactar con nosotros y le daremos instrucciones.

➤ Evite el contacto con la piel: lávese las manos antes y después de manipularlos.

➤ La dosis varía de un paciente a otro, por lo que **siga las recomendaciones médicas**.

Recuerde que es fundamental para alcanzar una buena respuesta molecular la adecuada adherencia al tratamiento, es decir, intentar que no se olvide ninguna o casi ninguna dosis **y no interrumpir nunca el tratamiento** sin que se lo diga su médico.

Evite el pomelo y el zumo de pomelo, También intente no tomar conjuntamente con zumos de carácter ácido, espácielo al menos una hora. Igualmente si necesita tomar un antiácido se recomienda separar la toma de acalabrutinib al menos 2 horas. Si precisa tomar un protector gástrico se aconseja evitar omeprazol y derivados y tomar famotidina al menos 2 horas después de la administración de acalabrutinib o bien 10 horas antes,

Qué hacer si...

• Si se ha olvidado tomar una dosis: tómela si quedan más de 9 horas para la próxima dosis y después, retome su horario habitual. Nunca tome dosis doble para compensar una olvidada.

• Si vomita, no tome otra dosis y continúe su tratamiento con normalidad.

Más información en

<https://www.sefh.es/escuela-de-pacientes-enfermedad-detalle.php?id=6>

Eventos adversos

Hay que decir que no todas las personas los padecen y que generalmente aparecen al principio y desaparecen conforme avanza el tratamiento. En cualquier caso ante la aparición de algún síntoma no dude en consultar. Los **más frecuentes** son:

- Aumento de infecciones
- Dolor de cabeza
- Náuseas, vómitos y diarrea o estreñimiento
- Dolor abdominal
- Alteraciones cardíacas
- Reacciones dérmicas
- Dolor ósea/muscular
- Sangrado, hematomas

AVISE A SU MÉDICO RÁPIDAMENTE SI TIENE: una reacción alérgica grave; signos de infección como tos, escalofríos, dificultad al orinar o fiebre; signos de sangrado (heces negras, sangre en la orina, hematomas importantes); convulsiones; confusión; alucinaciones o signos cardíacos (palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad al respirar).

Contraindicaciones

- Si usted es alérgico a Acalabrutinib o a cualquiera de los excipientes.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

Precauciones

- Si padece una enfermedad hepática (hepatitis B) o problemas de **corazón** o de ritmo cardíaco (hipertensión o fibrilación auricular).
- Advierta a su médico si va a someterse a una **intervención quirúrgica programada**.
- Algunos fármacos **anticoagulantes** (acenocumarol, apixaban, edoxaban, rivaroxaban o dabigatran) o **antiplaquetarios** (ácido acetilsalicílico o clopidogrel) pueden aumentar el riesgo de sangrado.
- Se recomienda una **adecuada hidratación** (incluye beber suficiente agua), usar gel de baño sin detergente y champús suaves y, si se reseca la piel, cremas hidratantes.
- Consulte con su médico y/o farmacéutico antes de vacunarse. Se recomienda protección solar.
- **Medidas anticonceptivas:** mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos muy efectivos (método barrera) durante y hasta 3 meses después de finalizar.

Interacciones

Pregunte a su farmacéutico o médico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma: antifúngicos (itraconazol, voriconazol,...); antibióticos (claritromicina, rifampicina); antivirales; antiácidos y protectores gástricos, anticoagulantes (warfarina, acenocumarol), algunos medicamentos para el corazón, hipérico o pomelo.