

SABÍA
QUE...

Sobre su medicación

Micofenolato de mofetilo es un medicamento inmunosupresor, que modula la respuesta inmunitaria del organismo. Se utiliza para prevenir el rechazo de un órgano trasplantado o para el tratamiento de determinadas enfermedades de carácter autoinmune tales como uveítis, síndrome nefrótico, dermatomiositis, vasculitis, esclerodermia, etcétera.

¿Cómo tomarlo?

- **Vía oral** y debe ingerirse el comprimido ENTERO con un vaso de agua.
- Se toma cada 12 horas y preferiblemente con el estómago vacío. La cantidad es variable según patología y características del paciente, con lo que su médico le indicará la que le venga bien a usted.
- Se puede tomar con o sin alimentos, pero intente hacerlo siempre de la misma manera.
- No deben triturar ni partir los comprimidos para evitar la inhalación del polvo; y asimismo se debe evitar el contacto directo con la piel o las mucosas. Si este se produce debe lavar la piel con abundante agua y jabón. Las mucosas se deben lavar con agua corriente.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si no ha pasado mucho tiempo tome su dosis, pero si ya han pasado más de 6 horas espere a la toma siguiente.
NO TOME NUNCA UNA DOSIS DOBLE para compensar la que olvidó.

Precauciones:

1. Limitar exposición al sol y luz UV. **Muy importante usar protector solar.**
2. Riesgo aumentado de infecciones oportunistas. Le indicarán controles hematológicos que debe seguir
3. Evitar vacunas de organismos vivos.
4. Usar **método anticonceptivo eficaz** durante el tratamiento y durante los 90 días posteriores.

NO TOME MICOFENOLATO SI ...

- 1) ES USTED ALÉRGICO AL PRODUCTO O A ALGUNO DE SUS EXCIPIENTES.
- 2) Si está **embarazada** o pudiera estarlo.
- 3) Si está en **periodo de lactancia**.
- 4) Si es usted una mujer en edad fértil y **no usa un método anticonceptivo altamente eficaz**.

Reacciones adversas:

Algunos de los **problemas más frecuentes**, que no quiere decir que vayan a aparecer, son náuseas o diarrea, disminución de la cantidad de glóbulos blancos o glóbulos rojos en la sangre o mayor frecuencia de aparición de infecciones leves. Su médico realizará análisis de sangre regularmente, para registrar cualquier cambio.

Otros efectos adversos no deseados: reacciones alérgicas, fiebre, sensación de mucho cansancio, dificultad para dormir, dolor (como dolor de estómago, dolores articulares o musculares, dolor al orinar, dolor de cabeza,...) síntomas gripales e hinchazón.

Aunque muy raros, consulte a su médico si notase cualquiera de los siguientes efectos adversos: síntomas de infección como fiebre o dolor de garganta, si le aparecen cardenales o una hemorragia de forma inesperada, si tiene erupción extendida con hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta y dificultad para respirar.

Interacciones con otros medicamentos:

MICOFENOLATO tiene interacciones con otros fármacos que pueden comprometer a la eficacia de los tratamientos o provocar efectos adversos. Por ejemplo:

Colestiramina y otros fármacos que se unen a ácidos biliares.
Antiácidos (Almax, Rennie, Alka Selzer,..) o preparados que contengan hierro deben espaciarse al menos dos horas de las tomas de micofenolato.
Inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol, pantoprazol,..): evitar su uso conjunto.
También con otros fármacos como rifampicina o aciclovir.

CONSULTE SIEMPRE A SU FARMACÉUTICO o MÉDICO SOBRE MEDICAMENTOS O PLANTAS MEDICINALES QUE VAYA A TOMAR PARA EVITAR INTERACCIONES.