

SABÍA QUE...

**Mirikizumab** es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-interleuquina 23p 19 (IL-23p 19). Concentraciones elevadas de IL-23 se asocian con la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. La neutralización de la IL-23 inhibe estas acciones. Como consecuencia directa, se reduce en la frecuencia de las deposiciones, hemorragias rectales, fatiga y dolor abdominal.

El **objetivo** del tratamiento es, además de aliviar la inflamación y el dolor, frenar el curso de la enfermedad, por lo que es importante que no olvide ninguna toma aunque se encuentre mejor.

### Presentaciones y posología

**Mirikizumab** se presenta en plumas precargadas de 100 mg.

A la hora de su administración, existe una primera fase de inducción intravenosa de 300mg que será administrada en las semanas 0,4 y 8. Mientras que la pauta de mantenimiento consiste en dos plumas de 100mg cada 4 semanas.

Este intervalo puede variar a criterio clínico. Atégase siempre a lo que le diga su médico.

### No usar en caso de :

- Alergia a mirikizumab o alguno de sus componentes.
- Si padece una infección activa (gripe, infección urinaria, infección de piel,...)
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias, ya que si fuese así correría riesgo de infección grave.
- En caso de embarazo y en caso de lactancia consulte siempre con su médico.

### Consejos:

- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna vacuna o si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental.
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique.
- El tabaco puede provocar fracaso al tratamiento.
- Es importante también que siga hábitos saludables y realice ejercicio físico moderado con frecuencia tal como le hayan dicho.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas, ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.



- La vía de administración de mirikizumab es **subcutánea**.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas .
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.

Recuerde que es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la pluma fuera de la nevera alrededor de media hora.



**Administración de la pluma:** siga las instrucciones del prospecto

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una inyección, póngase la siguiente tan pronto como lo recuerde y establezca un nuevo calendario a partir de la nueva fecha. Nunca se administre una dosis doble (dos dosis el mismo día) para compensar la dosis olvidada.

### Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Riesgo aumentado de infecciones leves. En caso de infecciones graves se debe interrumpir el tratamiento y reanudarlos una vez resueltos.
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor)
- Cefalea (dolor de cabeza).
- Artralgia (dolor de articulaciones).
- Erupción cutánea.

Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, cansancio generalizado, heridas que no cicatrizan, o problemas dentales.