

SABÍA
QUE...

- **Epidyolex®** es una solución para administración oral que contiene extractos de cannabis (denominados “cannabinoides”).
- Se utiliza en **síndrome de Lennox-Gastaut** o **síndrome de Dravet** en combinación con clobazam cuando no han respondido a otros tratamientos. También crisis asociadas con el complejo de esclerosis tuberosa (CET) que tampoco hayan respondido.

Posología

Se presenta en un bote de 100 mililitros (ml) y cada ml contiene 100 mg de cannabidiol. La dosis es individual para cada paciente y para cada patología.

Generalmente se instaure de una manera progresiva y lo habitual es comenzar con 2,5 mg/kg cada 12 horas (5 mg/kg diarios). Semanalmente, y en función de la eficacia y la tolerabilidad, se irá ajustando la dosis.

Los alimentos pueden afectar a su absorción, así que tómelo con o sin comida pero intentando que sea siempre de la misma manera. Se puede administrar por sondas.

El envase incluye jeringas de 1 ml y 5 ml, y se utilizarán una u otra en función de la dosis total. Es posible incluso utilizar ambas (si por ejemplo tiene una dosis de 3,4 ml deberá usar la de 5 para coger los 3 ml y la de 1 para los 0,4 restantes).

La validez una vez abierto es de **12 semanas**

El frasco contiene también un adaptador para cargar las jeringas. Siga exactamente las instrucciones del prospecto en cuanto al manejo y limpieza de las jeringas

Para administrarlo coloque la punta de la jeringa en el **interior de la mejilla** y vaya empujando suavemente, sin forzar. No dirija la jeringa a otras zonas de la boca.

No utilizar en...

- Si es alérgico a los extractos de cannabis o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Por ejemplo si es alérgico al sésamo.
- Si tiene un problema hepático grave

Embarazo y lactancia

- No hay datos tanto en un caso como en otro, con lo que no se aconseja su uso tanto en período de embarazo como el de lactancia.

Si viaja al extranjero lleve un informe clínico y compruebe si es legal su uso en el país de destino

Precauciones

- Si tiene antecedentes de consumo de drogas o abuso de sustancias.
- Si padece algún tipo de trastorno mental, incluyendo cuadro graves de depresión
- Precaución a la hora de manejar maquinaria peligrosa, sobre todo al inicio del tratamiento, ya que puede provocar somnolencia
- Este medicamento contiene etanol
- No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia renal

Efectos adversos

Se dan fundamentalmente en la fase inicial de titulación (primeras dos semanas aproximadamente), aunque algunas veces pueden continuar

- Sensación de mareo o cansancio. Procure levantarse despacio cuando esté sentado.
- Somnolencia o confusión.
- Diarrea
- Puede que le provoque un aumento de las transaminasas (enzimas hepáticas). Es muy importante que acuda regularmente a sus controles de sangre

Consulte a su médico si notase

- Pérdida de contacto de la realidad.
- Depresión: informe ante cualquier síntoma de depresión.
- Irritabilidad frecuente
- Si notase dolor amarillento en los ojos o piel, orina más oscura de lo normal y/o dolor abdominal persistente.

Interacciones

- ✓ Cannabidiol tiene interacciones con otros medicamentos, pudiendo hacer que éstos tengan un mayor efecto. A modo de ejemplo
- ✓ Otros antiepilépticos, sobre todo valproico y clobazam
- ✓ Otros medicamentos como warfarina, rifampicina, everolimus, sirolimus, tacrolimus, omeprazol, digoxina, morfina, teriflunomida, etcétera
- ✓ También debe tener precaución con fármacos que también provocan sedación

Consulte a su farmacéutico o médico si va a tomar alguna medicación o preparado nuevo