

SABÍA QUE...

Se ha demostrado que un mensajero químico llamado CGRP interviene en la aparición de la migraña. El principio activo de Emgality, el **galcanezumab**, es un anticuerpo monoclonal (un tipo de proteína) diseñado para unirse al CGRP bloqueando la unión de éste a su receptor y previniendo así que se provoque la migraña..

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

La migraña es una cefalea caracterizada por episodios recurrentes de dolor, de 4 a 72 horas de duración, que se acompaña de síntomas intestinales y sensitivos. El dolor suele ser de intensidad moderada a grave, unilateral y con punzadas, empeorando con la actividad física; y suele acompañarse de náuseas, fonofobia y fotofobia. Puede cursar con o sin aura.

Este tratamiento NO cura la enfermedad. El objetivo es preventivo: reducir la frecuencia, intensidad y duración de las crisis, mejorando así la calidad de vida y reduciendo el impacto de la enfermedad en la actividad diaria del paciente

Posología

La dosis recomendada es de 120 mg de galcanezumab inyectado (vía subcutánea) una vez al mes, tras una dosis de carga inicial de 240 mg. No obstante siga las instrucciones de su médico.

Qué hacer si ha olvidado una dosis

- Administre la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde y continúe con su pauta habitual a partir de esta última dosis administrada

NUNCA se ponga una dosis doble para compensar un olvido

Precauciones

- Pacientes con ciertas enfermedades cardiovasculares graves
- No olvide seguir las medidas higiénico-dietéticas del sueño, ejercicio regular y manejo de desencadenantes, que deben seguir siendo la base de la prevención.
- Si está embarazada o cree que puede estarlo no se lo ponga sin consultar a su médico.

No utilizar en caso de...

- De alergia a galcanezumab o cualquiera del resto de componentes de Engality®
- En periodo de lactancia

Efectos adversos. En general se tolera bien, pero puede presentarse:

- Reacciones en la zona de inyección o picor
- Estreñimiento
- Vértigo

Si notase cualquiera de los siguientes síntomas: espasmos musculares muy frecuentes, sarpullido, inflamación (párpados, cara, labios), dificultad para respirar o convulsiones avise a su médico.



- La vía de administración de galcanezumab es **subcutánea**.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas .
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.

Recuerde que es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor **de media hora**.

Interacciones

No se esperan interacciones con otros medicamentos, no obstante comuníquenos cualquier tratamiento nuevo con fármacos o plantas medicinales ya que, por ejemplo, tomados de forma crónica podrían favorecer a la aparición de estreñimiento o interferir con otra medicación preventiva que tenga.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.