

SABÍA QUE...

Sobre su enfermedad

La **hipercolesterolemia** consiste en la presencia de colesterol en sangre por encima de los niveles considerados normales. Este aumento, que se asocia a problemas coronarios, depende de la dieta, el sexo, el estilo de vida y la síntesis endógena. De esta manera, en la concentración de colesterol en sangre intervienen factores hereditarios y dietéticos, junto a otros relacionados con la actividad física.

ES MUY IMPORTANTE mantener niveles de colesterol total y LDL adecuados para evitar infartos, anginas de pecho, ictus, etcétera. Para ello debe hacer correctamente su tratamiento y seguir las indicaciones que le den en cuanto a dieta y ejercicio físico

Sobre su medicación


Inclisiran es una molécula innovadora, basada en ARN de interferencia humano que actúa en última instancia disminuyendo la acción de la proteína PCSK9. Está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar y no familiar) o dislipemia mixta, como tratamiento complementario a la dieta, bien en combinación con una estatina u otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes que no consiguen alcanzar sus objetivos, o bien en pacientes con intolerancia o contraindicación para estatinas.

Posología

La pauta habitual suele ser de una inyección cada seis meses, aunque entre las dos primeras dosis sólo deben transcurrir tres meses.

día0	mes1	mes2	mes3	mes4	mes5	mes6	mes7	mes8	mes9
									

Cada jeringa precargada es de un solo uso.



- La vía de administración es **subcutánea**
- Las mejores zonas para la inyección son aquéllas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos, como por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta



Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

Tras la inyección, presionar con un algodón el sitio de inyección durante unos segundos y **no frotar**.

Recuerde que es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con tranquilidad, sin prisas. No agite la jeringa ni la utilice si el líquido del interior aparece descolorido, turbio o con partículas visibles

Reacciones adversas

El efecto adverso más frecuente son reacciones en el lugar de inyección, con eritema (enrojecimiento), erupciones o dolor.

Avisé a su médico si notase algún efecto adversos compatible con reacción alérgica, tales como erupción generalizada, opresión en el pecho y falta de aire o hinchazón en el rostro, boca, lengua o garganta

No usar

En caso de alergia al medicamento a alguno de los excipientes.

Precauciones

- ✓ En caso de embarazo no hay muchos datos y, aunque parezca que no vaya a producir efectos en el feto, valore con su médico los posibles riesgos y beneficios
- ✓ Se desconoce si se excreta en leche materna. Valórela igualmente con su médico

Interacciones

Dadas sus características farmacocinéticas no se esperan interacciones entre inclisiran y otros fármacos, pero si está también en tratamiento con **estatinas** consulte siempre a su farmacéutico o médico ante cualquier nuevo tratamiento, plante medicinal, etcétera que vaya a tomar.