

SABÍA
QUE...

Miltefosina es un antiparasitario que está indicado en el tratamiento de distintas infecciones por leishmania, tanto visceral como cutánea. Aunque también tiene actividad frente a otros parásitos

Cómo debo tomarlo

La dosis cambia mucho según indicación, aunque generalmente oscila entre 100 y 150 mg (2-3 cápsulas) al día en adultos y recuerde que

- La administración debe dividirse en 2-3 tomas diarias.
- El tiempo transcurrido entre cada una de las tomas no debe ser inferior a 4 horas.
- Se deben tomar las cápsulas con un buen vaso de agua y **con comida**, enteras, sin abrir. (con el estómago vacío puede provocar más molestias gastrointestinales)

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible pero, si ya está cerca de la siguiente toma, espere a ésta.

No tome una dosis doble para compensar olvidos

No usar si:

- Es alérgico al principio activo o a alguno de sus excipientes
- Presenta insuficiencia hepática o renal grave
- Está embarazada o en período de lactancia
- Miltefosina está contraindicada en el síndrome de Sjogren-Larsson

Precaución en:

Insuficiencia hepática o renal moderada. Sin datos sobre su seguridad, así que actuar con precaución

Informe a su médico si tiene problemas de índole hematológico

Efectos adversos

Los más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Picor
- Mareos
- Dolor abdominal, náuseas y vómitos
- Dolor de cabeza
- Somnolencia

Si notase síntomas de reacción alérgica (problemas para tragar, hinchazón de cara, urticaria generalizada, ...)o algún efecto adverso grave, comuníquelo a su médico lo antes posible. Igualmente si tiene muchos vómitos comuníquelo también.

Interacciones

No se esperan interacciones con otros medicamentos por interferencia en el metabolismo. No obstante, consulte si está tomando anticonceptivos porque puede verse afectada la eficacia de éstos

Tenga precaución en caso de náuseas porque puede verse alterada la absorción de otros medicamentos

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos