



## ¿ Qué es y para qué se utiliza ?



**Rimstar** es una mezcla de cuatro fármacos (rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol), que se usa para la fase inicial del tratamiento de las infecciones por *Mycobacterium tuberculosis*.

### Posibles efectos adversos

Molestias gastrointestinales

Aumento del ácido úrico que no requiere intervención terapéutica.

Coloración de fluidos corporales como orina, lágrimas o sudor. Tener en cuenta si se utilizan lentes de contacto.

Cambios en el ciclo menstrual en tratamientos prolongados.

Sequedad de piel y boca y alteraciones del gusto. Es conveniente mantener una buena ingesta de líquidos y usar cremas hidratantes si hiciera falta.

Dolores de hueso, sobre todo de hombros en tratamientos largos.

### Los siguientes efectos adversos son muy raros, pero de ocurrir debe ponerse en contacto con su médico:

Diarrea persistente o aparición de sangre o moco en las heces

Hormigueo, entumecimiento o temblores en las extremidades

Sangrado frecuente

Cansancio inusual

Aftas bucales extendidas

Síntomas de reacción alérgica grave.

Alteraciones de la visión

Confusión mental o alucinaciones

Coloración amarilla de piel u ojos

### Interacciones:

Este medicamento presenta muchas interacciones con otros fármacos e incluso con productos de herboristería. Es **MUY IMPORTANTE** que consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta, productos de herboristería o suplementos dietéticos.

### Precauciones:

Si ha sufrido hepatitis inducida por fármacos

Si tiene artritis gotosa

No usar en caso de alergia a alguno de sus componentes

Evitar la exposición excesiva al sol

Limite lo máximo posible la ingesta de alcohol durante el tratamiento



## Horario de su tratamiento !



	AL LEVANTARSE	DESAYUNO		COMIDA	MERENDA		CENA	ANTES DE ACOSTARSE
Tratamiento	8	9 10	11-12-13	14 15 16	17 18	19-20	21 22	23 24
<b>Rimstar®</b> rifampicin, 150 mg isoniazid, 75 mg pyrazinamid, 400 mg ethambutol, hydrochlorid, 275 mg 60 comprimidos tabletas Mycobacterium tuberculosis Bakterienkillingmittel	● ● ●							

### .. Rimstar ® ..

El número de comprimidos depende del peso del paciente, y puede ir desde tres a seis diarios. Tómelos juntos en ayunas por la mañana, pero si no lo tolera puede intentar tomarlas después de un desayuno ligero (poca cantidad y que no sea graso en exceso).

Si toma un antiácido (Almax, Bicarbonato, Alka-Selzer, Rennie,...): hágalo 3-4 horas antes o 3-4 horas después de tomar Rimstar®.

Si toma protector de estómago del grupo de los inhibidores de la bomba de protones (Ejemplo: omeprazol, pantoprazol,...) tómelo unos minutos después de Rimstar®.

### ¿Qué hacer si se ha olvidado una dosis?-

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, pero si ya está próxima la siguiente dosis espere a ésta y no la tome

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué hacer si vomita?

Si usted vomita en un plazo de 2 horas después de la administración de este medicamento debe tomar una dosis adicional. Si han pasado más de 2 horas, no es necesario tomar nada.

**R**ecuerde que durante el tratamiento, debe utilizar métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo. Y debe usarlo hasta 30 días después de la última pastilla.

