

SABÍA QUE...

Tezepelumab (Tezspire®) es una agente biológico dirigido sobre una linfopoyetina: TSLP. Esta sustancia es inducida por los desencadenantes del asma y provoca la liberación de citoquinas asociadas a la inflamación de las vía respiratorias. Se utiliza en el tratamiento del asma alérgica grave de cualquier etiología, mejorando la función respiratoria y reduciendo el número y la intensidad de las crisis.

El **objetivo** es prevenir los síntomas tanto en reposo como tras ejercicio, mantener una función pulmonar lo más normal posible y evitar restricciones en la vida diaria

Presentaciones y posología

Se presenta en jeringas precargadas y plumas de 210 mg
La pauta recomendada es de una administración cada cuatro semanas, aunque su médico le podría indicar un intervalo distinto. Aténgase siempre a lo que le indique éste.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis de tezepelumab, inyéctesela tan pronto como lo recuerde. En general si ha pasado poco tiempo debe seguir con su programación y si ha pasado mucho reprogramar desde ese día, pero consulte en cualquier caso. Nunca se administre una dosis doble para compensar olvidos

Consejos:

- Es muy importante que se haga sus analíticas y vaya a las revisiones con la frecuencia que le indiquen.
- Tenga en cuenta que es un tratamiento a largo plazo y que deben pasar al menos **DOS semanas** para ver sus beneficios
- No debe reducir los corticoides de forma brusca, sino progresivamente tal como le programe su médico

Posibles efectos adversos que pueden aparecer

Se dan en un porcentaje bajo de pacientes, pero los más frecuentes son:

- Riesgo aumentado de infecciones leves como faringitis. En caso de infecciones graves se debe interrumpir el tratamiento y reanudarlo una vez resuelta
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor)
- Dolor de las articulaciones

Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, dolor en el pecho, falta de aire o desmayos

No usar en caso de:

- Alergia a tezepelumab o alguno de sus componentes
- Si padece una infección activa en ese momento debe postponer su tratamiento
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias, ya que si fuese así correría riesgo de infección grave

En caso de embarazo o lactancia acuda su médico para, entre ambos, valorar beneficios y posibles riesgos

¿Cómo se administra?



- La vía de administración de Xolair es **subcutánea**
- Las mejores zonas para la inyección son aquéllas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos, como por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazos o muslos.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- Alterne el punto de inyección y anótelos
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta

Es importante preparar la medicación en un espacio limpio y llevar a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. NO utilice NINGUNA FUENTE DE CALOR para ello



JERINGA: Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

Interacciones con otros fármacos

En general no presenta muchas interacciones farmacológicas, pero informe a su, farmacéutico o médico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Esto es especialmente importante si está utilizando:

- medicamentos para tratar una infección causada por un parásito, ya que tepelezumab puede reducir el efecto de sus medicamentos,
- vacunas de microorganismos vivos. Consulte siempre antes de vacunarse

Este medicamento se lo han prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos