

SABÍA
QUE...

Guselkumab es un anticuerpo humano monoclonal anti-interleuquina 23 (IL-23), proteína que tiene un papel clave en el desarrollo de enfermedades como la psoriasis. Al neutralizar la IL-23 se reduce el eritema, así como la induración y descamación presente en las lesiones de la psoriasis en placas. El objetivo del tratamiento es, además de aliviar la inflamación y el dolor, parar el curso de la enfermedad, por lo que es importante que no olvide ninguna toma

Presentaciones y posología

Guselkumab (Tremfya) se presenta en jeringas precargadas de 100 mg. La pauta habitual de inicio es de 100 mg (1 jeringa) en las semanas 0 y 4 seguida de una dosis de mantenimiento cada 8 semanas. La "fase de inducción" se administra al principio en intervalos más cortos para alcanzar respuesta lo antes posible. Atégase siempre a lo que le indique su médico

No usar en caso de:

- Alergia a guselkumab o alguno de sus componentes
- Si padece una infección activa (gripe, infección urinaria, infección de piel,...)
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias ya que, si fuese así, correría riesgo de infección grave
- Embarazo o lactancia

Consejos:

- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna vacuna o si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Posibles efectos adversos que pueden aparecer:

- Riesgo aumentado de infecciones leves. En caso de infecciones graves se debe interrumpir el tratamiento y reanudarlo una vez resuelta
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor)
- Dolor abdominal, diarrea, náuseas
- Cefalea (dolor de cabeza) y dolor de huesos

Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, cansancio generalizado, heridas que no cicatrizan o problemas dentales

Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora



- La vía de administración de Tremfya es **subcutánea**
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos como por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- Alterne el punto de inyección y anótelolo
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta



Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante. Tras la inyección, presionar con un algodón el sitio de inyección durante unos segundos sin frotar

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una inyección, póngasela tan pronto como lo recuerde. Si se ha retrasado menos de una semana, puede administrarse la dosis olvidada y mantener el calendario habitual. Si ha pasado más de una semana, póngase la dosis olvidada y establezca un nuevo calendario a partir de la nueva fecha. Nunca se administre una dosis doble (dos dosis el mismo día) para compensar la dosis olvidada