

SABÍA QUE...

**Bertralstat** es un fármaco utilizado para prevenir las crisis de angioedema en adultos y adolescentes mayores de 12 años que padecen angioedema hereditario. Se trata de un inhibidor de la calicreína que, en última instancia, actúa disminuyendo la cantidad de bradicinina en el torrente sanguíneo, lo que previene la hinchazón y el dolor que puede causar el angioedema hereditario.

## OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

El angioedema hereditario es una enfermedad genética provocada por un déficit del inhibidor del complemento (grupo de proteínas de la sangre) C1. Puede limitar su actividad diaria al provocar episodios de hinchazón y dolor en diferentes partes del cuerpo como pueden ser manos y pies, cara, lengua, párpados y labios, laringe, genitales, estómago e intestino. Esta hinchazón suele ser similar a la de la urticaria, pero se presenta debajo de la piel en vez de la superficie.

Este tratamiento NO cura la enfermedad. El objetivo es preventivo: reducir la frecuencia, intensidad y duración de las crisis, mejorando así la calidad de vida y reduciendo el impacto de la enfermedad en la actividad diaria del paciente.

## Posología

- La dosis recomendada es de 150 mg (una cápsula) una vez al día con una comida.
- Tome la cápsula con alimentos y con un vaso de agua, en cualquier momento del día pero a la misma hora aproximadamente.
- Siga siempre **las instrucciones de su médico** y recuerde comentar siempre cualquier **medicación nueva** que le receten.

## Qué hacer si ha olvidado una dosis

- Tome la dosis olvidada en cuanto se acuerde, pero si ya ha transcurrido mucho tiempo no la tome. Espere a la dosis del día siguiente.
- **NUNCA** tome una dosis **doble** para compensar un olvido.

## No utilizar en caso de...

- De alergia a bertralstat o cualquiera del resto de componentes de Orladeyo®
- En caso de **embarazo**

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante al menos un mes después de la última dosis

## Precauciones

- Pacientes con enfermedad hepática o renal grave.
- Pacientes con riesgo de sufrir ciertas anomalías del latido cardíaco (prolongación del intervalo QT).
- En caso de lactancia materna háblelo con su médico y valorar entre ambos los beneficios y los posibles riesgos.

## Efectos adversos

En general se tolera bien pero puede presentarse, sobre todo al principio:

- Dolor de cabeza
- Dolor abdominal
- Vómitos, ardor de estómago, gases
- Erupción cutánea

Si notase algún efectos secundario grave **avise a su médico** que podría tratarse de una reacción alérgica.

## Interacciones

Bertralstat presenta **interacciones** con bastantes fármacos. A modo de ejemplo:

Anticonceptivos orales  
Dextrometorfano (utilizado para aliviar la tos)  
Algunos antidepresivos tricíclicos  
Algunas plantas medicinales  
Inmunosupresores  
Ciertos medicamentos en concreto como amlodipino, digoxina, dabigatrán, ciclosporina, rifampicina, tioridazina, pimozida, fentanilo, midazolam, tolbutamida.

Ese efecto sobre el ritmo cardíaco de prolongar el intervalo QT puede verse agravado si toma conjuntamente otro fármaco que también los produzca

**Es muy importante que si va a tomar algún medicamento o preparado medicinal nuevo consulte siempre a su farmacéutico o médico**

Más información en

<https://angioedema-aedaf.haei.org/>

*Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos*