

SABÍA
QUE...

Fidaxomicina (Dificlir®) es un antibiótico del grupo de los macrólidos, que se usa para tratar diarreas o colitis ocasionadas por una bacteria llamada Clostridium difficile. Estas infecciones se producen generalmente por la toma excesiva de otros antibióticos.

Cuando hay tratamientos antibióticos muy prolongados, se elimina al resto de bacterias de nuestra flora normal intestinal y se impone Clostridium difficile provocando la infección. **Es muy importante evitar el abuso de antibióticos**

¿Cómo tomarlo?

La dosis habitual de tratamiento en adultos es de 5 ml (200 mg) dos veces al día durante **10 días**. No obstante atégase a las instrucciones de su médico. Debe intentar que el intervalo entre dosis sea lo más cercano a 12 horas

Para obtener la suspensión debe disolver el polvo con 105 ml de agua, agitar enérgicamente durante un minuto y dejar reposar después durante 5 minutos. El volumen resultante es de 110 ml. Conservar en nevera y...

!!! agítelo siempre antes de usarlo !!!

Sus síntomas pueden mejorar antes de que la infección esté completamente curada, pero es importante completar el tiempo total del tratamiento

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. **No tome nunca una dosis doble** para compensar las olvidadas.

Precaución

Consulte a su médico si está embarazada o en período de lactancia. La absorción del medicamento es muy baja y no se espera ningún efecto sobre el feto o el lactante; no obstante no hay mucha experiencia.

Se han descrito algunos casos de alergia cruzada con antibióticos del grupo de los **macrólidos** (claritromicina, azitromicina, espiramicina o eritromicina). Debe tener precaución e estos casos.

No usar si:

Si tiene alergias al principio activo, a alguno de sus excipientes o a fármacos de su grupo.

Si durante el tratamiento con fidaxomicina tiene lugar una reacción alérgica grave, debe interrumpir el tratamiento y adoptar las medidas adecuadas.

Efectos adversos

Los más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Síndromes intestinales como náuseas, vómitos o estreñimiento
- Gases
- Erupción cutánea o picor leve

Si experimentara algún efecto adverso grave como signos de infección, signos de hipersensibilidad o cualquier otra cosa póngase en contacto con su médico

Interacciones

No está aconsejada la administración conjunta con inhibidores potentes de la gp-P, tales como ciclosporina, ketoconazol, eritromicina, claritromicina, verapamilo o amiodarona.

Tampoco debe tomarlo con el medicamento contra el cáncer venetoclax y debería ajustar la dosis de otros como ibrutinib o enzalutamida.

Espaciar al menos dos horas de la toma de probióticos.

No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento nuevo, planta medicinal, vitamina o cualquier otra cosa

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.