

SABÍA
QUE...

Sobre su medicación

Fostamatinib es un profármaco que se usa para tratar la trombocitopenia inmune crónica, una enfermedad causada por la falta de plaquetas en la sangre y que provoca sangrados y aparición de hematomas con facilidad. Actúa inhibiendo una tirosina quinasa presente en el bazo, y reduciendo así la destrucción de las plaquetas en ese órgano.

Dosis y cómo tomarlo

- La dosis debe ser individualizada, en función del número de plaquetas. Se empieza con 100 mg de fostamatinib (1 comprimido de 100 mg) dos veces al día y según el número de plaquetas podrán prescribirle desde 150 mg cada 12 horas hasta 100 mg una sola vez al día. En caso de una única toma diaria, ésta debe ser **por la mañana**.
- Igualmente podrían reducirle la dosis por la aparición de toxicidad: hipertensión, aumento de enzimas hepáticas o descenso del número de neutrófilos.
- Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos, y procurando que sea siempre a la misma hora en la medida de lo posible. No mastique, triture o rompa los comprimidos.
- Evite el zumo de pomelo mientras tomando este tratamiento.

¿Qué hacer si...

Si olvida una dosis: Tómela si no han pasado 4 horas. Pero si ha pasado más tiempo no tome la dosis olvidada y continúe su tratamiento con la siguiente dosis programada. **NO TOME NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar olvidos.

Si vomita: NO tome otra dosis y continúe su tratamiento con normalidad.

No tome Tavalisse si...

- ... es alérgico a fostamatinib o alguno de los excipientes
- ... está embarazada o en período de lactancia (en caso de estar en edad fértil debe utilizar medidas anticonceptivas seguras). Si queda embarazada mientras está tomando el fostamatinib debe suspender el tratamiento

Precauciones:

Si ha tenido o tiene algún problema en el hígado.

- Fostamatinib puede provocar en algunos pacientes aumento de la presión arterial. Es **IMPORTANTE** que controle su tensión arterial sobre todo al principio del tratamiento.
- Si está tomando anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva
- Si padece osteoporosis o es paciente joven donde aún no se producido el cierre de la epífisis
- Debe adoptar medidas anticonceptivas para evitar quedarse embarazada.

Reacciones adversas:

Durante el tratamiento con fostamatinib pueden aparecer, que no en todos los pacientes aparecen, reacciones adversas que incluyen:

- Diarrea es el más frecuente.
- Mareos
- Aumento de la presión arterial. Sobre todo al principio controle su **TENSIÓN ARTERIAL**
- Alteración de las enzimas del hígado (transaminasas).
- También pueden aparecer aunque ya con mucha menos frecuencia: erupción en la piel y sudor, disminución de defensas y cansancio.

Informe inmediatamente a su médico si tiene alguno de los estos síntomas.

Reacción alérgica grave, coloración amarillenta de piel u orina más oscura de lo normal, si presenta hinchazón en piernas dolorosa y que desprende calor, si quedara embarazada durante el tratamiento, en caso de sobredosis y ante cualquier efecto adverso grave que le ocurra mientras está tomando el fármaco.

Interacciones de la ciclosporina con otros medicamentos:

Fostamatinib puede interactuar con bastantes fármacos. A modo de ejemplo: Estatinas para el colesterol, algunos antibióticos como claritromicina o rifampicina, algunos antifúngicos, fármacos para el VIH como cobicistat o ritonavir, algunos fármacos para procesos oncológicos (enzalutamida, apalutamida,...), ciertos antiepilépticos y otros como digoxina, midazolam, diltiazem, etcétera. Y como se dijo antes complejos vitamínicos, laxantes o antiácidos con cationes divalentes. Por ejemplo el hipérico o hierba de san Juan.

ES MUY IMPORTANTE que nos consulte siempre que le prescriban un medicamento, planta medicinal o complejo vitamínico nuevo.